



Cambodian Farmer Federation
Association of Agricultural Producers
CFAP-CAMBODIA

បច្ចេកទេសដាំដំណាំ

១. ដំណាំត្រសក់/1. Cucumber

២. ដំណាំម្រះ/2. Bitter gourd

៣. ដំណាំត្រឡាច/4. Winter melon

៤. ដំណាំសណ្តែកព្រីង/3. Stringbean

រោងចក្រលើកទី៣ ចំនួន១០០០ច្បាប់

តាំងឡើង



មាតិកា



ចំណងជើងអត្ថបទ	ទំព័រ
១. មាតិកា ៖.....	I
២. អារម្ភកថា ៖.....	II
៣. បច្ចេកទេសដាំដំណាំដោយប្រើកៅស៊ូគ្របរង៖.....	១
៤. បច្ចេកទេសដាំត្រសក់៖.....	២-១០
៥. បច្ចេកទេសដាំម្រះ៖.....	១១-២៤
៦. បច្ចេកទេសដាំត្រឡាច៖.....	២៥-២៨
៧. បច្ចេកទេសដាំសណ្តែកកូរ៖.....	២៩-៣៧
៨. សត្វមានប្រយោជន៍ក្នុងចំការ៖.....	៣៨-៤០
៩. សត្វចង្រៃក្នុងចំការ៖.....	៤១-៤២
១០. តារាងវិភាគសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងបន្លែ ១០០ក្រាម៖.....	៤៣-៤៨
១១. ការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីកសិកម្មសំរាប់កំចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ៖.....	៤៩-៥០
៧. អត្ថប្រយោជន៍របស់ជីធម្មជាតិ៖.....	៥១
៨. ជីកំប៉ុស្តគោក៖.....	៥២-៥៤
៩. ជីកំប៉ុស្តទឹក៖.....	៥៥
១០. ជីអ៊ុយរ៉េ៖.....	៥៦-៥៨
១១. ថ្នាំកសិកម្មផ្សំពីរុក្ខជាតិ៖.....	៥៩-៦១
ឯកសារយោង៖.....	៦២
១៤. អ្នកចូលរួមពិភាក្សា និងរៀបចំសៀវភៅបច្ចេកទេស៖.....	៦៣

អនុសាសនា

ឯកសារនេះត្រូវបានចងក្រងដោយ សមាគមសហព័ន្ធកសិករកម្ពុជានៃអ្នកផលិតកសិកម្ម (ស៊ីហ្វាប-កម្ពុជា) ក្រោមការដឹកនាំក្នុងការរៀបចំសៀវភៅនេះឡើងដោយ លោក **សុខ សុផា** ដែលជាប្រធានស្ថាបនិកនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិស៊ីហ្វាប-កម្ពុជា ។

យោងតាមសកម្មភាពការងារនៃសមាគមសហព័ន្ធកសិករកម្ពុជានៃអ្នកផលិតកសិកម្ម ក្នុងការអនុវត្តន៍ការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាកសិករ សហគមន៍ សមាគមដែលជាសមាជិកនិងក្រៅសមាជិកតាមតំបន់គោលដៅនៃប្រទេសកម្ពុជា ហើយពួកគាត់ជួបការលំបាក ក្នុងការដាំដុះដំណាំ បន្លែ សមស្របតាមបច្ចេកទេស សុវត្ថិភាពខ្ពស់ឆ្លើយតបបានតាមតំរូវការទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។

ការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាកសិករអោយប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនស្បៀងអាហារព្រមទាំងរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ជាពិសេសកសិករ អ្នកប្រកបរបរកសិកម្មនៅតាមតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជា។

សមាគមសហព័ន្ធកសិករកម្ពុជានៃអ្នកផលិតកសិកម្ម សរសេរកាត់ “ ស.ស.ក.ជ ” ជាអក្សរឡាតាំង “ Cambodian Farmer Federation Association of agricultural Producers ” ឈ្មោះជាអក្សរកាត់ ស៊ីហ្វាប-កម្ពុជា “ CFAP-Cambodia ” ជាសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម សហគមន៍ព្រៃឈើ សហគ្រាសខ្នាតតូច នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវផលិតភាពស្បៀងអាហារប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ សមាគម រួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀង ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃកសិករដែលរស់នៅជនបទនិងជួយសំរួលការលំបាករបស់កសិករតាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានជាបឋម រួមមាន៖ កម្មវិធីអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល ផ្សព្វផ្សាយ វប្បធម៌សង្គមផងដែរ

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយមិនមានទំរង់រើសអើងនិន្នាការនយោបាយ ពូជសាសន៍ សាសនា និង ពណ៌សម្បុរឡើយ ។

ខ្ញុំបាទ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនសៀវភៅបច្ចេកទេសនេះ នឹងជាជំនួយដ៏ប្រសើរបំផុត សំរាប់ប្រជាកសិករក្នុងការដាំដុះដំណាំ-បន្លែ សមស្របតាមបច្ចេកទេស និងអាចឆ្លើយតប តាមតំរូវការទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ។

ខ្ញុំបាទ យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសទទួល បានជោគជ័យក្នុងការប្រកបរបរដាំដុះដំណាំ-បន្លែ ក៏ដូចជាមុខរបរបន្ទាប់បន្សំដទៃទៀតក្នុង ការចិញ្ចឹមជីវិត ជីវភាពល្អប្រសើរ និងរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គម ។

ថ្ងៃទីខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤

ប្រធានស្ថាបនិកនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិ

អ្នកចូលរួមពិភាក្សា និងប្រែប្រួលចម្លើយនៅបច្ចេកទេស

- លោក សុខ សុផា ប្រធានស្ថាបនិកនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិ សមាគមសហព័ន្ធកសិករកម្ពុជានៃអ្នកផលិតកសិកម្ម (CFAP-Cambodai)
- លោក យស្ស ធឿន ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម នៃសមាគមសហព័ន្ធកសិករកម្ពុជានៃអ្នកផលិតកសិកម្ម
- លោក លោកស្រី បុគ្គលិក ទីប្រឹក្សាសមាគមសហព័ន្ធកសិករកម្ពុជានៃអ្នកផលិតកសិកម្ម ជាច្រើនរូបទៀត។

ឯកសារយោង

១. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសាលារៀនស្រែកសិករលើដំណាំបន្លែ និងការធ្វើពិសោធន៍ តាមវិធីសាស្ត្រគ្រប កៅស៊ូលើរង (រៀបចំដោយអង្គការ IDE ក្នុងកិច្ចសហការ ជាមួយ សមាគមស៊ីហ្វាបកម្ពុជា CFAP និងគាំទ្រដោយ SNV)
២. រូបភាពសកម្មភាពអនុវត្តផ្ទាល់លើរងបង្ហាញរបស់កសិករនៅតាមតំបន់គោលដៅ នៃសមាគមស៊ីហ្វាបកម្ពុជា CFAP

បច្ចេកទេសដាំដំណាំ ដោយប្រើកៅស៊ូគ្របរង

១-បុព្វបទ ៖

ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យលើផលិតកម្មដំណាំបន្លែ យើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់ដឹងនូវ កត្តាចាំបាច់មួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយដំណើរការផលិតកម្មក្នុងនោះរួមមាន ការជ្រើសរើសពូជ ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ ការគ្រប់គ្រង ជីជាតិដី ការស្រោចស្រព និង វិធីសាស្ត្រអនុវត្តការដាំដុះ។ ការដាំដុះដំណាំ តាមវិធីសាស្ត្រគ្របគល់ដំណាំ គឺជាវិធីសាស្ត្រ ដ៏សមស្របមួយដែលកសិករទូទៅបានចាប់ ផ្តើមអនុវត្តនិងប្រើប្រាស់តាមរបៀបខុសៗគ្នា ដោយនៅរដូវវស្សាកសិករនិយមដាំគ្របរងដោយប្រើប្រាស់កៅស៊ូប្លាស្ទិចព្រោះ រដូវវស្សា មានភ្លៀងជោគជាំ ហើយការគ្របកៅស៊ូអាចជួយការកាត់បន្ថយការជាំទឹក របស់ដំណាំ ការពារកុំអោយស្មៅដុះ រក្សាបានការជ្រាបចេញនៃដីដែលបានដាក់ និងជួយឱ្យដំណាំ ដុះលូតលាស់បានល្អ ។ ការប្រើប្រាស់កៅស៊ូគ្របរងដំណាំ វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សំរាប់ ដំណាំគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នូវរដូវវស្សាហើយប្រជាកសិករដែលដាំដំណាំកំពុងបាន ប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើន ។

២-គោលបំណង ៖

- កំណត់បាននូវវិធីសាស្ត្រដាំដុះដ៏សមស្របដែលកសិករអាចទទួលយកបាន
- គណនាផលចំណេញដែលទទួលបានក្នុងផលិតកម្មបន្លែ តាមរយៈបច្ចេកទេសដាំ ដុះដោយមានការប្រើប្រាស់កៅស៊ូគ្របរង
- កសិករយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ និងអនុវត្តតាមបច្ចេកទេស
- ចងក្រងឯកសារបច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែសំរាប់កសិករ

ដំណាំត្រសក់ចំណារ

ត្រសក់ចំណារ (គូគូមីស សាទីរុស) គឺជាដំណាំបន្លែយកផ្លែ ដែល ត្រូវបាន គេស្គាល់ និង ពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ធ្វើជាអាហារប្រចាំថ្ងៃ នៅទូទាំងពិភពលោក វាមានប្រភពដើមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា និងជា បន្លែ បុរាណមួយ ដែលគេបាន ធ្វើការដាំដុះតាំងពី ៣០០០ឆ្នាំមុន រហូតដល់ បច្ចុប្បន្ននេះ និងបានរាលដាល យ៉ាងឆាប់ រហ័ស នៅពាសពេញទ្វីបអាស៊ី និង ទ្វីបអឺរ៉ុប ក្នុងកំឡុងសតវត្សទី៦ និង សតវត្សទី៧ ហើយគេបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់វាចូលទៅក្នុងគ្រួសារ គុយគូប៊ីតាសេ។ ចាប់ពីពេល ដាំដុះរហូតដល់ ពេល ប្រមូលផលចប់រួចរាល់ ត្រសក់មានអាយុកាល ៦៥ថ្ងៃ ដល់ ៨០ថ្ងៃ ការប្រែប្រួលនៃអាយុកាលរបស់វា គឺអាស្រ័យទៅលើបរិស្ថាន ទឹកឆ្អឹងដាំដុះ និង ប្រភេទ ពូជ ដែលបានដាំផងដែរ ហើយចាប់ពីពេលដាំរហូតដល់ចេញផ្កា មានរយៈ ពេលពី ៣៥- ៤៥ថ្ងៃ និង ចាប់ពីពេលដាំរហូតដល់ពេលប្រមូលផល លើកដំបូង មានរយៈ ពេលពី ៤៥- ៥៥ថ្ងៃ។

១. លក្ខខណ្ឌដុះលូតលាស់របស់ដាំត្រសក់

ជាទូទៅ ដំណាំត្រសក់អាចដុះលូតលាស់បានល្អ នៅក្នុងសីតុណ្ហភាព ជាមធ្យម ក្នុងចន្លោះពី ២០-៣០ អង្សាសេ តែសីតុណ្ហភាព ដែលល្អបំផុតសំរាប់វាគឺក្នុង ចន្លោះពី ២២- ២៣អង្សាសេ។ ចាំបាច់ត្រូវ មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងរយៈពេល ពី ១០-១១ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដីដែលសមស្របសម្រាប់ដាំដុះត្រសក់គឺជាប្រភេទដីល្បាប់ល្បាយខ្សាច់ដែល មានជីជាតិ ល្អ ហើយមិនជាទឹកនិងមាន ប៉េហាស់ (ផេះ) ចន្លោះពី ៥,៨ - ៦,៨ ។

ចំពោះតម្រូវការ ពន្លឺ គឺជាកត្តាមួយសំខាន់សំរាប់ការដុះលូតលាស់ និងធ្វើ រស្មីសំយោគ របស់ ត្រសក់ ដូច្នេះ ដើម្បីជួយអោយ ត្រសក់ ដុះលូតលាស់ បានល្អ ទឹកឆ្អឹងដាំដុះ ក្នុង



រល្អបណ្តាលពេជ្រ ចំនួន ២គីឡូក្រាម



មើមក្អាចព្រៃ ចំនួន ២គីឡូក្រាម



សំបកកន្ទួត ចំនួន ២គីឡូក្រាម



ប្រងព្រៃ ចំនួន ៥គីឡូក្រាម



ទឹកធម្មតា ១០-១២លីត្រ



ម្សៅសាប៊ូ ចំនួន ១ក្តាប់ដៃ

II. សំភារៈធ្វើថ្នាំពុលផ្សំពីរុក្ខជាតិ

- ពីដុង ឬ កូនពាងចំណុះ ៣០លីត្រ
- កំប៉ុងទឹកដោះគោ
- ស្បែកចាស់ (សម្រាប់ច្រោះ ក្នុងករណីប្រើបំពង់បាញ់ថ្នាំ)

III. របៀបធ្វើ

- យកគ្រឿងផ្សំ ដែលមានខាងលើ បុកដាក់ចូលពីដុង ឬ កូនពាង
- ទុករយៈពេល ៧-១០ ថ្ងៃទើបអាចប្រើបាន

IV. របៀបប្រើប្រាស់

- ទឹកថ្នាំកន្លះកំប៉ុងទឹកដោះគោ លាយជាមួយទឹកធម្មតាចំនួន ១-២លីត្រ លាយ ជាមួយម្សៅសាប៊ូ ចំនួន ១ស្លាបព្រា (បាញ់នៅពេលកូនបន្លែនៅតូច)
- ទឹកថ្នាំមួយកំប៉ុងទឹកដោះគោ លាយជាមួយទឹកធម្មតាចំនួន ១-២លីត្រ និង ម្សៅ ចំនួន ១ស្លាបព្រាបាយ (បាញ់នៅពេលបន្លែធំ)
- រៀងរាល់ ២-៣ថ្ងៃបាញ់ម្តង

II. វត្ថុធាតុដើម



ស្លឹកទន្លេនៃត្រច័ន្ទ ១គីឡូក្រាម



ថ្នាំជក់ (ថ្នាំខ្លាំងចំនួន ២ខាំ)



ទឹកធម្មតាចំនួន ៥លីត្រ

III. របៀបធ្វើ

- យកថ្នាំខ្លាំង ទឹក ស្លឹកទន្លេនៃត្រច័ន្ទដាក់លាយចូលគ្នាក្នុងឆ្នាំង
- ស្មារអោយពុះ
- ទុកឱ្យត្រជាក់ចាំយកមកប្រើប្រាស់

IV. របៀបប្រើប្រាស់

- ប្រើទឹកថ្នាំសុទ្ធ (មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៅលើពពួកចំណីដំណាំ)

ថ្នាំកសិកម្មផ្សំពីរុក្ខជាតិច្រើនមុខ

I. ត្រីខ្សែ



រំដេងព្រៃ ចំនួន ៣គីឡូក្រាម



ស្លឹកក្រៃ ចំនួន ៣ខាំ



សំបកស្ពៅ ចំនួន ២គីឡូក្រាម



ថ្នាំខ្លាំង ចំនួន ២ខាំ


គឺគេអាចដាំត្រសក់បាន ២ដូវ គឺថា ដូវរំហើយ ចាប់ពីខែ តុលា រហូតដល់ខែធ្នូ និង ដូវវស្សា ចាប់ពីខែ កក្កដា រហូតដល់ខែ សីហា។ ប្រសិនបើយើងអនុវត្តការដាំដុះតាម បច្ចេកទេស ដែលមានដូចជា ការប្រើ កៅស៊ូគ្របលើរង ឬ ការប្រើសំណាញ់កាត់បន្ថយ កំដៅជាដើម នោះយើងអាចដាំត្រសក់បានពេញមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែអ្នកដាំដុះ ចាំបាច់ត្រូវចំណាយ ធនធានមួយចំនួនសំរាប់ទិញសម្ភារៈទាំងនោះ។

២. បច្ចេកទេសដាំដុះត្រសក់

២.១. ការជ្រើសរើសពូជ

ការជ្រើសរើសពូជ ត្រូវពិនិត្យកលើ កត្តាសំខាន់ៗ មួយចំនួន ដូចខាង ក្រោម៖

- ពូជមិនប្រកាន់រដូវ និង ពូជធន់នឹងជំងឺ ផ្សេងៗដែល តែងតែកើត មាន នៅក្នុងតំបន់ដាំដុះ។
- ប្រភេទពូជ ដែលអ្នកបរិភោគនិយមច្រើន និងមាន តម្រូវការ ទីផ្សារខ្ពស់។



២.២.ការរៀបចំដី និងលើករងសំរាប់ដាំដុះ

- ក្បូរហាលដី ក្បូរដីជម្រៅ 20-25cm (ស្មើនឹង ២-២,៥ តឺក) ហើយហាលដីទុក ចោលក្នុងរយៈពេល ៧-១០ ថ្ងៃ។
 - លើករងក្នុងទំហំ 0.8m (ស្មើនឹង ៨ តឺក) និង កំពស់ 25-30cm (ស្មើនឹង២,៥- ៣តឺក)ចន្លោះពីររងមួយទៅរងមួយទៀតមានប្រវែង 0.5m (ស្មើនឹងកន្លះម៉ែត្រ)។
 - ការប្រើដីទ្រាប់បាត ឬដីលាមកសត្វក្នុងកម្រិត ៣០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយរង លាយជាមួយកំបោរកសិកម្មចំនួន ៨ ខាំ ក្នុងមួយរង និងដី 15-15-15 ចំនួន ២.៥ ខាំក្នុង មួយរង។ លាយច្របល់ដី និងកំបោរកសិកម្មចូលទៅក្នុងដីឱ្យបានស្មើសាច់ល្អ ហើយស្រោច ទឹកឱ្យជោគដីល្មម រួចក្រាលកៅស៊ូគ្របលើរងហើយរក្សាទុក រយៈពេលពី ៧-១០ ថ្ងៃមុន ពេលដាំ ។
- រូបភាពទី១៖ ការរៀបចំរងដាំត្រសក់



-៤-

ឧបសម្ព័ន្ធ៥

ថ្នាក់សិក្សាផ្សំពីរុក្ខជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើដំណាំបន្លែ

- ថ្នាក់សិក្សាផ្សំពីរុក្ខជាតិ២មុខ
- ថ្នាក់សិក្សាផ្សំពីរុក្ខជាតិច្រើនមុខ
- ថ្នាក់សិក្សាផ្សំពីរុក្ខជាតិមួយមុខ

គោលបំណង៖ គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាក់សិក្សាផ្សំពីរុក្ខជាតិ គឺកាត់បន្ថយការ ចំណាយទៅលើការទិញថ្នាំគីមីកសិកម្ម ព្រោះការប្រើប្រាស់ថ្នាក់សិក្សាផ្សំពីរុក្ខជាតិ មិនធ្វើ ឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយ និងធ្វើឱ្យបន្លែ មានសជាតិឆ្ងាញ់ និងមានតំលៃនៅលើទីផ្សារ ទៀតផង។

I. សម្ភារធ្វើថ្នាក់សិក្សាផ្សំពីរុក្ខជាតិ

- ☀ ផ្ទាំងសំរាប់ស្មោរ
- ☀ ចង្ក្រានអូសដុត

-៥-

V. ការថែទាំ

- ពីដុះដល់យើងបានដាក់ជីនោះ ត្រូវបើកគំរូបសិនទើបក្រឡុក ឬកូរ ១ដង/ថ្ងៃ
- ពេលបើកគម្របពីដុះក្រឡុករួចហើយត្រូវបិទទៅវិញឱ្យជិតល្អ
- ទុកពីដុះទឹកជីក្នុងម្លប់ ជៀសវាងកុំឱ្យត្រូវថ្ងៃ។

VI. កំរិតប្រើប្រាស់

- ទុកទឹកជីដែលយើងបានលាយនោះរយៈពេល ពី ១០ ទៅ ១៥ ថ្ងៃ ទើបអាចយកទៅប្រើបាន

- យកទឹកជី កន្លះកំប៉ុងទឹកដោះគោ លាយជាមួយទឹកធម្មតាចំនួន ២០លីត្រ
- ស្រោចដំណាំជារៀងរាល់ ៤ ទៅ ៥ ថ្ងៃម្តង
- លាយជាមួយបាយ អោយជ្រូកស៊ី ឆាប់ធំឆាត់។

VII. របៀបប្រើប្រាស់

- ☀ ផ្តាច់ជីទុករយៈពេល ២-៣សប្តាហ៍ ទើបអាចប្រើបាន
- ☀ ទឹកជី ១លីត្រ លាយទឹកធម្មតា៥លីត្រ សម្រាប់ស្រោចបន្លែពេញវ័យ
- ☀ ទឹកជី ១លីត្រ លាយទឹកធម្មតា១០លីត្រ សម្រាប់ស្រោចកូនបន្លែ។



២.៣.របៀបបណ្តុះកូន

- សាបគ្រាប់នៅក្នុងកន្លែងឬថាសបណ្តុះកូន ឬសម្ភារក្នុងស្រុកអាចធ្វើជំនួសបាន
- ល្បាយដីបណ្តុះកូន ត្រូវដុតកំដៅសម្លាប់មេរោគ មុនពេលយកវាមកប្រើ
- ប្រើថ្នាំការពារជំងឺផ្សិត លាយជាមួយគ្រាប់ពូជមុនពេលយកវាទៅបណ្តុះ។ វិធី

ប្រើថ្នាំផ្សិត គឺបន្ទាប់ពីត្រាំគ្រាប់ ១៥-២០ នាទី ត្រូវយកទឹកស្អាត ១កែវ លាយជាមួយថ្នាំផ្សិត ១ស្លាបព្រាកាហ្វេ រួចកូរអោយសព្វគ្រាំទុករយៈពេល ១៥-២០នាទី បន្ទាប់មកលាងសំអាតជាមួយទឹកស្អាត ទើបយកទៅផ្តាច់ក្នុងថង់ទឹកកក ដោយគ្របអោយបានជិត រក្សាទុក ១យប់ទើប យកគ្រាប់ពូជនេះ ទៅបណ្តុះក្នុងកន្លែង រយៈពេលពី ៥-៧ ថ្ងៃ កូនដំណាំអាចដាំបាន ។

រូបភាពទី២៖ ការរៀបចំគ្រាំគ្រាប់ត្រសក់ និងការបណ្តុះកូនត្រសក់



២.៤.របៀបដាំដុះ


- ដាំ ២ជួរ ក្នុងមួយរង ហើយចន្លោះគុម្ព 0.5m (ស្មើនឹងកន្លះម៉ែត្រ) ហើយដាំនៅតាមចំហៀងរង។

- ចំនួនគុម្ពសរុប = 40 គុម្ពក្នុងមួយរង x 5 រង = 200 គុម្ព។

២.៥.ការប្រើប្រាស់ដីបំប៉នក្រោយដាំ

- ដីបំប៉នលើកទី១ ប្រើដី FDP (ដីគ្រាប់ធំ)

ចំនួន ១គ្រាប់ ក្នុងមួយគុម្ព ដាក់បង្កប់ក្នុងដីជំរៅ និងចម្ងាយ 10cm (ស្មើនឹង ១តឺក) ពីគុម្ពដំណាំ ហើយដាក់នៅពេលពូនគល់ដំបូង ឬពេល ដាក់ទ្រើង។



រូបភាពទី ៣ ការដាក់ដីបំប៉ន

- ដីបំប៉នលើកទី២ ប្រើដី FDP (ដីគ្រាប់ធំ) ចំនួន ១គ្រាប់ ក្នុងមួយគុម្ព ដាក់បង្កប់ក្នុងដីជំរៅនិងចម្ងាយ 10cm (ស្មើនឹង១តឺក) ពីគុម្ពដំណាំហើយដាក់នៅពេលត្រសក់ចេញផ្កាដំបូង ។

- ដីបំប៉នលើកទី៣ ប្រើដីអ៊ុយរ៉េក្នុងកម្រិត ៣ក្រាម ក្នុងមួយគុម្ពដាក់ បង្កប់ក្នុងដីកែវគុម្ពដំណាំ នៅក្រោយពេលប្រមូលផលលើកដំបូងរួច។ វិធីមួយទៀតយើងអាច

- យកដីអ៊ុយរ៉េ ១ស្លាបព្រាបាយ លាយជាមួយទឹក ១០លីត្រ ស្រោចលើដំណាំមួយរង ដែលមានបណ្តោយ ១០ម៉ែត្រ ។

III. របៀបលាយតន្ត្រីធាតុដើម

- លាយកន្ទក់ និងដីម៉ត់ឱ្យបានសព្វល្អ
- លាយស្ករជាមួយទឹក រួចចាក់ចូលទៅក្នុងល្បាយដី ដែលបានលាយជាមួយកន្ទក់រួចហើយ

- រួចច្របល់ល្បាយខាងលើអោយបានសព្វល្អ
- ពិនិត្យមើលកុំអោយសើម ឬ ស្ងួតពេក (ល្មមពូតជាប់គ្នាដូចដីឥដ្ឋ)
- ខ្ទប់ដីដែលលាយរួចហើយជាមួយក្រណាត់ពណ៌ស

IV. របៀបធ្វើឱ្យនៅជាជីវិតរីករាលដាល

- ទុកកញ្ចប់ដីដែលយើងខ្ទប់រួចហើយក្នុងម្លប់ រយៈពេល៣យប់ (មិនឱ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃទេ)
- ពិនិត្យមើល បើសិនមានផ្សិតពណ៌ស តូចៗ ដុះចេញពីដីដែលយើងខ្ទប់នោះ ដីដែលយើងបានធ្វើពិតជា ជីត្រឹមត្រូវហើយ
- ទឹកធម្មតាចំនួន ២០លីត្រ លាយជាមួយស្ករត្នោតធុនអន់ ចំនួន ១គីឡូក្រាម ដាក់ចូលក្នុងពីដុង រួចក្រឡុកឱ្យរលាយចូលគ្នាស្មើសាច់
- ច្របាច់ដុំដី ដែលយើងបានផ្តាច់ទុកនោះ ឱ្យរាយទាំងអស់ ទើបដាក់ចូលក្នុងពីដុង រួចក្រឡុកឱ្យសព្វល្អ។



I. វត្តមានតុល្យភាពសំណប់ឆ្នើមជីវិតថ្មី

- កន្ទក់ម៉ត់ ដែលមានជាតិអង្ករ ចំនួន ១គីឡូក្រាម
- ដីធម្មតា (ដីដែលគ្មានភ្លើងឆេះ) ចំនួន ១គីឡូក្រាម
- ទឹកធម្មតា ចំនួន ១លីត្រ (មិនប្រើទឹកម៉ាស៊ីន ឬទឹកអណ្តូងស្អប់ទេ)
- ស្ករត្នោត (ស្ករជូនអន់បំផុត) ចំនួន ១គីឡូក្រាម

II. សង្គ្រោះសំណប់ឆ្នើម

- ពិដុង ឬ កានថ្មី ចំណុះ៣០០លីត្រ
- កញ្ចែញវែងដី
- ក្រណាត់ស (ហាមប្រើក្រណាត់ពណ៌)
- ប្រដាប់លាយ (ចានដែក កាតុន....)

៣. ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រៃ និងជំងឺ

៣.១ ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រៃ

ក. រុយស

វិធានការគ្រប់គ្រងនឹងកំចាត់

- ប្រើបន្ទះប្លាស្ទិកពណ៌លឿង ធ្វើអន្ទាក់សំរាប់ទាក់ទាញមេចំណាស់ដោយមានលាបថ្នាំឬប្រេងស្អិតៗ
- ប្រើក្លិនម្រះព្រៅម្យ៉ាងដើម្បីចាប់រុយសយកទៅបំផ្លាញចោល
- ប្រើថ្នាំកសិកម្មផ្សំពីរុក្ខជាតិស្លោមកបាញ់លើត្រសក់ នៅក្នុងដំណាក់កាលពងរបស់រុយសមិនទាន់ញាស់
- ប្រើថ្នាំអាកតារ៉ា ឬថ្នាំអាបាមីចទ័នអាចមានប្រសិទ្ធភាពល្អ ក្នុងការ ទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញ ប៉ុន្តែត្រូវប្រើតាមការណែនាំរបស់ស្លាកថ្នាំ ដើម្បីជៀសវាងការ បំពុលដល់ បរិស្ថានជាពិសេស គឺប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ពពួកសត្វមានប្រយោជន៍។ **(សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ២)**

ខ. ចៃហ្វស និងចៃហ្វម

វិធានការគ្រប់គ្រងនឹងកំចាត់

- ប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលដែលផ្សំពីរុក្ខជាតិលាយជាមួយទឹក ហើយបាញ់រៀងរាល់ ១សប្តាហ៍ម្តងដើម្បីការពារការបំផ្លាញ។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរប្រើថ្នាំពុលគីមី **កុចហ្វីដ័រ** កំរិតប្រើប្រាស់៖ ត្រូវលាយថ្នាំ ១០សេសេ ជាមួយទឹកចំនួន១០លីត្រ បាញ់លើផ្ទៃដីដំណាំ ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ។
- លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់៖** កំណត់ការបាញ់ថ្នាំនេះ ក្នុងរយៈពេលពី ១០ទៅ ១៥ថ្ងៃ មុនពេលប្រមូលផល ។

ពេលវេលាត្រូវបញ្ចប់៖ ត្រូវបញ្ចប់នៅពេលព្រឹកព្រលឹម ឬ ពេលល្ងាច ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ត្រូវពាក់របាំងមុខ ស្រោមដៃ និងសំលៀកបំពាក់ការពារខ្លួនឱ្យបានល្អ នៅពេលបាញ់ថ្នាំ ។

៣.២ ជំងឺលើដំណាំត្រីសក់

ក. ជំងឺស្រពោលដើម

វិធានការគ្រប់គ្រងនឹងកំចាត់

យើងអាចការពារនឹងកំចាត់ជំងឺនេះបានដោយបណ្តុះកូននៅក្នុងកន្លែងដែលយើងបានសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងដី។ ប្រសិនបើ វាធ្វើការបំផ្លាញផ្លូវផ្ទៃ យើងអាចប្រើថ្នាំ មេតាក់សីល (Methaxyl) ឬថ្នាំ ហ្វូសេទីល (Fosetyl-AI) មកបាញ់ការពារនៅលើស្លឹក នឹងនៅលើដីគឺអាចកាត់បន្ថយជំងឺនេះ ។

៤. ការស្រោចស្រព និងគ្រប់គ្រងទឹក

ត្រូវស្រោចស្រពដំណាំ ឱ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលា និងរក្សាសំណើមដីឱ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយ សមស្របតាមប្រភេទដី។ ចំពោះប្លង់ពិសោធន៍ ដែលប្រើកៅស៊ូប្លាស្ទិចគ្របរងយើងអាចស្រោចស្រព តាមវិធីសាស្ត្របង្កើនទឹកតាមចន្លោះរងនីមួយៗបាន ហើយក្នុងករណីដែលមានភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ ការស្រោចស្រព គឺពុំចាំបាច់ឡើយ ហើយបរិមាណទឹកដែលត្រូវស្រោចគឺពី ៣ - ៥ លីត្រ សំរាប់ផ្ទៃដីដាំដុះចំនួន ១ ម៉ែត្រការេ។

ជីកំប៉ុស្តទឹក

I. សំភារៈសំរាប់ធ្វើជីកំប៉ុស្តទឹក

- ពាង បាវក្រចៅ
- ដុំថ្មសម្រាប់សង្កត់ដី
- កំប៉ុងទឹកដោះគោ

II. វត្ថុធាតុដើម

- ជីស្រស់ចំនួន ១០ គីឡូក្រាម
- លាមកគោស្រស់ចំនួន ១៥-២០ គីឡូក្រាម
- ទឹកធម្មតាចំនួន ១៥០-២០០លីត្រ (១០ ទៅ ១៤ធុង)។

III. របៀបធ្វើ

- ដាក់ដុំថ្មចូលក្នុងបាវក្រចៅផ្នែកខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យបានជីលិចទៅក្នុងទឹក
- ដាក់ជីស្រស់ដែលបានចម្រៀងរួចហើយ និងលាមកសត្វដាក់ចូលក្នុងបាវ រួចចងមាត់ឱ្យជិត តែកុំចងណែនពេក ដោយទុកពីខ្សែចំណងឃ្លាតពីជីប្រមាណមួយចំណាស់ ព្រោះជីពេលត្រូវទឹកវាទឹកវាខ្លាំង
- យកដុំថ្ម ឬកំណាត់ឈើសង្កត់ពីលើបាវដែលដាក់ជីរួចហើយ ដើម្បីឱ្យបានជីលិចទៅក្នុងទឹក
- គ្របពាងជីឱ្យបានជិតល្អ និងយកឈើកូរវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីឱ្យជីឆាប់កាច់។

ស្រងាប់ដែលត្រូវប្រែប្រួលក្នុងរោងចក្រកំប៉ុស្ត

ស្រងាប់ទី៤: ដាក់ដីបាតត្រពាំង ឬ ដីដំបូកកំរាស់ ០.៥០តីក
ស្រងាប់ទី៣: ដាក់លាមកសត្វ អាចម៍គោ ក្របី ជ្រូក មាន់ទា កំរាស់ ០.៥០តីក
ស្រងាប់ទី២: ដាក់ដីស្រស់ ទន្លេនៃត្រ ពីលើកំរាស់ ១.៥០តីក
ស្រងាប់ទី១: ដាក់ស្លឹកឈើស្ងួត ឬ ចំបើង ខាងក្រោមកំរាស់ ១តីក

ចំណាំ: ត្រូវយកចេញនូវវត្ថុធាតុណាដែលមិនរលួយ ដូចជា សំបកកំប៉ុង ជ័រកៅស៊ូ ដែក អំបែងកែវ...។ល។

VI. របៀបប្រើប្រាស់៖

ដីកំប៉ុស្តដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាន គឺនៅពេលដែលជីនោះរលួយល្អ មាន រយៈពេល ២-៣ ខែ បន្ទាប់ពីធ្វើកំរិតប្រើប្រាស់យកទៅដាក់ស្រែគឺ ១០-២០ តោន លើផ្ទៃដី ១ ហិកតា។

មុនយកដីកំប៉ុស្តទៅប្រើត្រូវយកដែលក្នុងគំនរកំប៉ុស្តបើត្រជាក់អាចប្រើបាន ហើយ បើក្តៅទុកបន្ត។

៥. ការប្រមូលផល

រយៈពេលទទួលផលត្រសក់គឺប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទពូជ និងទីកន្លែងដែល បាន ដាំដុះ ប៉ុន្តែជាទូទៅ យើងអាចចាប់ផ្តើម ប្រមូលផលក្នុង រយៈពេល ៤០-៥០ថ្ងៃ ក្រោយ ពេលដាំ។ ប្រសិនបើ ត្រសក់ ដុះលូតលាស់ល្អ គេអាចប្រមូលផលបានពី ៨-១២ លើក ហើយអាចទទួលទិន្នផលបានចាប់ពី ២០-២៣៥តោន/ហិកតា អាស្រ័យទៅតាមពូជ ការ ដាំដុះ និងការថែទាំ។ បច្ចុប្បន្ន នៅតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួន អាចទទួលបាន ទិន្នផល រហូតដល់ ៣០-៦០តោន/ហិកតា ។



៦. ការតាមដានស្រែពិសោធន៍ និងប្រមូលទិន្នន័យ

៦.១. ទិន្នន័យរបស់ដំណាំដែលត្រូវប្រមូលរួមមាន

- ឈ្មោះដំណាំ និងប្រភពពូជ
- ផ្ទៃដីដាំដុះសរុប
- ចំនួនគុម្ពដំណាំ ដោយរាប់ក្នុងដំណាក់កាលប្រមូលផលលើកដំបូង
- ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំដាក់ដីបំប៉ន និងបរិមាណដែលប្រើ
- ទិន្នផល ប្រាក់ចំណូល និងថ្លៃ.ខែ ដែលបានប្រមូលផលក្នុងមួយលើក។

- វិធីសាស្ត្រស្រោចស្រព
- ប្រភេទសត្វល្អិត និងជំងឺដែលកើតមានច្រើនជាងគេ

៦.២. ទិន្នន័យផលិតកម្ម

- កត់ត្រារាល់ការចំណាយ លើសម្ភារផលិតកម្មដោយរាយមុខចំណាយ និងតម្លៃសរុបរបស់សម្ភារនីមួយៗដែលបានទិញសំរាប់ដំណើរការផលិតកម្មដំណាំ។
- តម្លៃប្រតិបត្តិនៅលើទីផ្សារ ដូចជាដឹកជញ្ជូន វេចខ្ចប់ ពន្ធលក់ដូរជាដើម។
- តម្លៃពលកម្ម ឧទាហរណ៍ ជួលពលកម្មរៀបចំដី បាញ់ថ្នាំ....។ល។

៧. គំរោងថវិកាសម្រាប់ប្លង់ពិសោធន៍ ដំណាំត្រសក់ច្រើង

រាយមុខចំណាយ	ឯកតា	បរិមាណ	ថ្លៃឯកតា(្ល)	សរុប(្ល)
គ្រាប់ពូជត្រសក់ 331	កញ្ចប់	២	១០.០០០	២០.០០០
កៅស៊ូគ្របរង	ម៉ែត្រ	៥០	៤០០	២០.០០០
កំបោរកសិកម្ម	គ.ក្រ	៥	១.០០០	៥០០០
ថាសបណ្តុះកូន	បន្ទះ	២	៥០០០	១០.០០០
ជីគ្រាប់ធំ FDP	គ.ក្រ	២	៤.០០០	៨.០០០
ជីគីមី១៥-១៥-១៥	គ.ក្រ	២	៣.០០០	៦.០០០
ថ្នាំផ្សិត	កញ្ចប់	១	១០.០០០	១០.០០០
សរុបចំណាយ				៧៩.០០០

ស្រទាប់ទី២: ដាក់ជីស្រស់ (ទន្ធនាខែត្រ) ពីលើកំរាល់ ១.៥០តីក

ស្រទាប់ទី៣: ដាក់លាមកសត្វ(អាចម៍គោ ក្របី ជ្រូក មាន់ទា) កំរាល់ ០.៥០តីក

ស្រទាប់ទី៤: ដាក់ដីបាតត្រពាំង ឬ ដីដំបូកកំរាល់ ០.៥០តីក បោះបង្គោលឬស្បូវ

ដែលមានប្រហោងនៅចំកណ្តាលរណ្តៅដើម្បីឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលល្អដល់ស្រទាប់ក្រោម និងងាយស្រួលជ្រាបទឹកពីលើដល់ក្រោមស្រោចទឹក២-៣ដង ក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ធ្វើសារឡើងវិញដូចពីមុនដោយរៀបជាស្រទាប់ៗ រហូតដល់គំនរកំប៉ុស្តមានកំពស់ ១-១.៥០ម៉ែត្រ

ក្រោយពីធ្វើរួចរយៈពេល ៣សប្តាហ៍ ត្រូវត្រឡប់គំនរកំប៉ុស្តសារជាថ្មីដោយយកស្រទាប់ខាងក្រោម មកដាក់ខាងលើ និងយកស្រទាប់ខាងលើមកដាក់ខាងក្រោមវិញ

បន្ទាប់ពីបានរយៈពេល ៥សប្តាហ៍ ត្រូវត្រឡប់គំនរជីកំប៉ុស្តម្តងទៀតដោយត្រឡប់ស្រទាប់ទាំងនោះដាក់ក្នុងសភាពដើមវិញ និងទុកអោយគំនរជីកំប៉ុស្តរលួយរយៈពេល ៤សប្តាហ៍ បន្ថែមទៀត។



រោងធ្វើជីកំប៉ុស្ត			
ស្រទាប់ទី៤			
ស្រទាប់ទី៣			
ស្រទាប់ទី២			
ស្រទាប់ទី១			

ជីកំប៉ុស្តតោក

ដំណាំប្រមូល

សមាជិករបស់ក្រុមដំណាំបន្លែទាំងអស់ ត្រូវតែធ្វើរោងជីអោយបានគ្រប់គ្នា ដើម្បីអោយមានជីធម្មជាតិ សម្រាប់ដាក់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមី។

ទំហំទេចជីដែលត្រូវបានសង្ខេប ៖ ទំហំ ២ x ៣ ម៉ែត្រ កំពស់ ១.៥ ម៉ែត្រ ជំរៅ ០.៥០ ម៉ែត្រ (កន្លះម៉ែត្រ) ដំបូលប្រក់ស្លឹក ជញ្ជាំងបិទដីជុំវិញ។

I. សំភារៈសំរាប់ធ្វើជីកំប៉ុស្តតោក ៖

☀ ចប បង្កី កាំបិត ពូថៅ ឈើ ឬ ឬស្សី ស្លឹកប្រក់ដំបូល ខ្សែ (រោងផ្សំជី)

II. វត្ថុធាតុដើម៖

- ☀ ជីស្រស់ លាមកសត្វ កាកសំណល់ផ្ទះបាយ
- ☀ ស្លឹកឈើស្ងួត គល់ជញ្ជាំង ដីបាតត្រពាំង ឬ ដីដំបូក

III. របៀបធ្វើ៖

ធ្វើទ្រុងមានដំបូលពីលើ ប្រើបង្គោលឬស្សី ដោយកំណត់យកផ្ទៃ ២ x ៣ ម៉ែត្រ ដោយចែកជាពីរផ្នែកសម្រាប់ធ្វើការប្រែត្រឡប់គំនរជី កន្លែងធ្វើរោងជីកំប៉ុស្តតោកធ្វើនៅកន្លែងជិតប្រភពទឹក តែជាកន្លែងដ៏ទូលមិនលិចទឹកនៅរដូវវស្សា។

ស្រទាប់ទី១: ដាក់ស្លឹកឈើស្ងួត ឬចំបើង ខាងក្រោមកំរាស់ ១ តឺក

ដំណាំប្រមូល ម៉ូម៉ូឌីតា ចារ៉ាន់ទី (Momordica charantia) ស្ថិតនៅ ក្នុងគ្រួសារ កូក្វីប៊ីតាសៀ (Cucurbitaceae) វាជាដំណាំមួយប្រភេទ ដែលដុះ លូត លាស់ល្អនៅក្នុងអាកាសធាតុ តំបន់ត្រូពិច វាត្រូវបានគេស្គាល់ និង និយមដាំដុះជាងគេ នៅភូមិភាគអាស៊ី-អាគ្នេយ៍ ព្រោះវាផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ធ្វើជាបន្លែ និងបន្លែកែច្នៃ ដាក់កំប៉ុង ជាពិសេស ប្រមូលជាប្រភព វត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម ផលិតឱសថ សំរាប់ទប់ស្កាត់ និងជួយព្យាបាល ជំងឺមហារីក ដំបៅផ្លើម ជាដើម (សូមមើលឧបសគ្គ៣)។

នៅកម្ពុជា គេដាំប្រមូលជាដំណាំប្រចាំរដូវ តែនៅប្រទេសខ្លះ គេបានដាំវាជាដំណាំច្រើនឆ្នាំ។ ប្រមូលជាដំណាំមួយ ដែលធន់នឹងកំដៅបានល្អបង្អស់ គេអាចដាំដុះបានពេញមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែ វាក៏ជាដំណាំ ដែលងាយទទួលរងនូវការបំផ្លាញដោយសារដំបៅផ្លើមទឹកផងដែរ។ ស៊ីតូឡូភាពដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ដំណាំប្រមូល ដុះលូតលាស់គឺនៅចន្លោះចាប់ពី 20 ទៅ 35 អង្សាសេ វាអាចធន់នឹងស៊ីតូឡូភាពទាបជាងគេ គឺរហូតដល់ 18 អង្សាសេ។ ប្រសិន បើដាំដុះខុសរដូវកាល យើងនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាច្រើនប្រភេទដូចជា អាកាស ធាតុក្តៅខ្លាំង ភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំ និងរងការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត និង ជំងឺច្រើនប្រភេទ។ ប្រមូលដ៏ដែលសមស្របជាមួយដំណាំប្រមូល គឺជាដីល្បាយមានជីជាតិល្អ និង មានកម្រិត pH ចន្លោះ 6.0-6.7 តែវាក៏អាចដុះលូតលាស់បាន នៅលើដីដែលមាន pH 8.0 បានដែរ។

១. បច្ចេកទេសដាំដុះ

១.១ .ការជ្រើសរើសពូជ

បច្ចុប្បន្នមានពូជម្រះ ច្រើនប្រភេទ ដែលគេកំពុងធ្វើការដាំដុះ នៅទូទាំង ប្រទេស កម្ពុជា តែនៅតំបន់ខ្លះ គេនិយមដាំពូជក្នុងស្រុក និង តំបន់ ខ្លះទៀត គេចូលចិត្តដាំពូជទំនើប ដែលផលិតចេញមកពីក្រុមហ៊ុន ដែលភាគ ច្រើនគឺជាពូជបង្កាត់ (F1) ដែលបាននាំចូល មក ពីបរទេស ដូចជាពូជម្រះរបស់ក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសវៀតណាម ប្រទេសថៃ និង ប្រទេស តៃវ៉ាន់ ដែលពូជទាំងនោះ សុទ្ធតែមានអត្រាដំណុះខ្ពស់ និង ទិន្នផលច្រើន ដូច្នេះ ការជ្រើសរើសពូជ គឺចាំបាច់ត្រូវគិតទៅលើតម្រូវការទីផ្សារ ដែលជា ចំណុច អាទិភាព ។



អត្ថប្រយោជន៍ជីវជាតិ

ផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗ របស់ជីវជាតិ

១. ជួយកែលំអរគុណភាពដី គឺជួយធ្វើឱ្យដីមានជីជាតិកាន់តែល្អប្រសើរឡើង និងមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ តាមតម្រូវការរបស់ដំណាំនិងរុក្ខជាតិគ្រប់ប្រភេទ។
២. ជួយធ្វើឱ្យដីមានសំណើមល្អ ងាយស្រួលសម្រាប់រក្សាទុក និងផ្គត់ផ្គង់ជាបណ្តើរៗទៅ ផ្តល់អោយរុក្ខជាតិបានយូរ
៣. ជួយធ្វើអោយដីជ្រួល មានដង្ហើមខ្យល់ចេញចូល ធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិអាចស្រូបយកអុកស៊ីសែន (O2) និងសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗ ពីខ្យល់បានល្អ។
៤. ជួយសម្របសម្រួល pH អោយបានសមស្រប (ដីមានជាតិអាស៊ីត-ដីជួរ ឬដីអាល់កាឡាំង)។
៥. ត្រូវប្រើកំបោស ១០តោន ក្នុងមួយហិកតា។
៦. ជួយទប់ស្កាត់ដល់ការហូរច្រោះ សីករិចរិល ដោយសារខ្យល់ ភ្លៀង និងជួយការពារកំដៅ ព្រះអាទិត្យ។

ប្រភេទថ្នាំគីមីកសិកម្មសំរាប់កំចាត់សត្វល្អិតចម្រុះ

ថ្នាំ Actara, Pegasus និងថ្នាំរុស៊ីន អាចមានប្រសិទ្ធភាពសំរាប់គ្រប់គ្រង ពពួកចៃ រុយស និងពពួកដង្កូវនេះបាន តែត្រូវ ប្រើតាមកម្រិតណែនាំរបស់ស្ថាប័នថ្នាំ។



ថ្នាំអាតារា



ថ្នាំប៉េហ្គាស៊ីន



ថ្នាំ ប៊ីចី (Bt) សំរាប់កំចាត់ដង្កូវយោលទោង



ថ្នាំរុស៊ីន

១.២. ការរៀបចំដីដាំដុះ

- គួរហាលដីអោយស្ងួត ហើយរាស់ប្រមូលយកស្មៅចេញ
- គួររាស់យ៉ាងតិចឱ្យបាន ៣-៤ ដង
- ទទឹង ១,២ ម៉ែត្រ បណ្តោយទៅតាមស្ថានភាពដីជាក់ស្តែង
- ចន្លោះជួរ ៨០សង់ទីម៉ែត្រ ចន្លោះគុម្ព ៥០-៦០ សង់ទីម៉ែត្រ

រូបភាពទី៤៖ ការរៀបចំរងដាំដុះ និងរបៀបចោះកៅស៊ូលើរង



២. របៀបបណ្តុះកូន

- សាបគ្រាប់នៅក្នុងកន្លែងឬថាសបណ្តុះកូនឬសម្ភារក្នុងស្រុកអាចធ្វើជំនួសបាន
- ល្បាយដីបណ្តុះកូន ត្រូវដុតកំដៅសម្លាប់មេរោគ មុនពេលយកវាមកប្រើ
- ប្រើថ្នាំការពារជំងឺផ្សិត លាយជាមួយគ្រាប់ពូជ មុនពេលយកវាទៅបណ្តុះ
- កូនសំណាបអាចយកវាទៅដាំលើរងបានពេលវាបានអាយុ ១៥-២០ថ្ងៃ។



៣. របៀបដាំដុះ

- ដាំ ២ជួរ ក្នុងមួយរង ហើយចន្លោះគុម្ព 0.5m (ស្មើនឹងកន្លះម៉ែត្រ) ហើយដាំនៅតាមចំហៀងរង

- ចំនួនគុម្ពសរុប = 40 គុម្ពក្នុងមួយរង x 10 រង = 400 គុម្ព។

៤. ការប្រើប្រាស់ដី

ការប្រើប្រាស់ដីលើដំណាំម្រះ គឺមានការប្រែប្រួល យោងទៅតាមប្រភេទដី និងប្រវត្តិនៃការដាំដុះដំណាំនៅលើដីនោះផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតម្រូវការដីសំខាន់ៗដែលដំណាំម្រះត្រូវការ និងពេលវេលាប្រើប្រាស់ ហើយបរិមាណ ពេលវេលាប្រែប្រួលទៅតាមតំបន់។ ការប្រើដី ដែលបានទទួលទិន្នផលល្អសំរាប់ដំណាំម្រះ គឺ

- ប្រើដីលាមកសត្វ ឬ ជីកំប៉ុស្តក្នុងកម្រិត ៣០គក្រក្នុងមួយរង សំរាប់ ទ្រាប់បាត ហើយបរិមាណដីនេះ ដាក់នៅពេលដំណាលគ្នាជាមួយការប្រើកំបោរកសិកម្ម មុនពេលគ្របកៅស៊ូ។

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីកសិកម្មសំរាប់កំចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីកសិកម្មសំរាប់កំចាត់សត្វល្អិតបំផ្លាញដំណាំ គឺជាវិធានការគីមីមួយដែលចាំបាច់ក្នុងករណីដែលដំណាំរងនូវការបំផ្លាញខ្លាំងប៉ុណ្ណោះ ពីពួកសត្វល្អិតចង្រៃ។ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យ និងអនុវត្តតាមស្លាកសញ្ញា ការណែនាំ នៅលើកញ្ចប់ថ្នាំ ដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ និងប្រើឱ្យចំគោលដៅ។

ដើម្បីឱ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីកសិកម្ម ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

- ពេលបាញ់ថ្នាំអ្នកត្រូវពាក់អាវ ពាក់ម៉ាស់ ស្រោមដៃ និងស្បែកជើងកងែង
- ពេលបាញ់ថ្នាំត្រូវពិនិត្យមើលទិសខ្យល់បក់
- មិនត្រូវបរិភោគចំណីអាហារពេលបាញ់ថ្នាំឡើយ
- លាងសំអាតខ្លួនប្រាណ និងសំលៀកបំពាក់ជាមួយសាប៊ូ ក្រោយ ពីការបាញ់ថ្នាំ
- កប់ ឬ ដុតសំបកថ្នាំដែលប្រើប្រាស់រួច
- រក្សាថ្នាំទុកនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព និងឱ្យផុតពីដៃក្មេង

ចំណាំ៖

ក្នុងករណីមានថ្នាំគីមីកសិកម្មចូលក្នុងភ្នែកអ្នក ចាំបាច់ត្រូវលាងជាមួយទឹកស្អាតជាមុនសិន រួចទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ ដើម្បីជួបជាមួយអ្នកជំនាញព្យាបាល។

23	ម៉ង់កាណែស	--	--	0.214 mg	9%
24	ផ្លូវ	450.61 mg	--	38 mg	6%
25	ស៊ីងស៊ី	--	--	0.24 mg	2%
Phyto-nutrients					
26	ការ៉ូតែនបៃតង	--	--	379 µg	--
27	ការ៉ូតែនអាល់ហ្វា	--	--	69 µg	--
28	លុយតេអ៊ីន	--	--	640 µg	--

- ប្រើជីប្រភេទ 15-15-15 ក្នុងកម្រិត ១០ក្រាម/គុម្ព ដាក់បង្គប់បាត រណ្តៅ មុនពេលដាំ
- ជីបំប៉នលើកទី១ ដាក់នៅពេលពូនគល់ ឬពេលដាក់ទ្រើង ប្រើជី 15-15-15 ក្នុងកម្រិត ១០ក្រាម/គុម្ព ដាក់បង្គប់ក្នុងដីចំនួន២កន្លែង នៅក្បែរគុម្ពចំងាយ ១០សម ពីគល់របស់វា។
- ជីបំប៉នលើកទី២ ដាក់នៅក្រោយពេលប្រមូលផលលើកទី១ ប្រើជីអ៊ុយរ៉េ ក្នុងកម្រិត ១០ក្រាម/គុម្ព ដាក់បង្គប់ក្នុងដីចំនួន២កន្លែង នៅក្បែរគុម្ពចំងាយ ១០សម ពីគល់របស់វា។
- ជីបំប៉នលើកទី៣ ប្រើជី FDP ក្នុងកម្រិត១គ្រាប់/គុម្ព ដាក់បង្គប់ នៅក្នុងដី ក្បែរគុម្ពដំណាំ នៅក្រោយពេលដាក់លើកទី២ បានរយៈពេល ១០-១២ថ្ងៃ ។



៥. របៀបធ្វើទ្រីង

នៅពេលដែលយើងឃើញប្រភេទដីតោងឡើងហើយ បើយើងពុំប្រញាប់ដាក់ ទ្រីងអោយវាឡើងទេ គឺអាចធ្វើអោយដើមប្រភេទដីតោងដូល ហើយវាវិនាស ប្រសិនបើក្នុង រដូវភ្លៀង អាចបង្កអោយផ្លែវាលួយស្អុយ និងមានជំងឺជាច្រើន។ សព្វថ្ងៃនេះគេនិយម ប្រើចំណារ ដែលធ្វើអំពីសំណាញ់ជ័រ ព្រោះវាមានតម្លៃថោក មុនពេលរាយសំណាញ់ យើង ត្រូវយកបង្គោល ដែលមានកំពស់ប្រវែង 2.5m មកដាំតាមបណ្តោយរង ចន្លោះពីបង្គោល មួយទៅបង្គោលមួយទៀតប្រវែង 2.5m ហើយរបៀបធ្វើទ្រីង គឺមានច្រើន បែប ដូចមាន បញ្ជាក់ក្នុងរូបភាពខាងក្រោមស្រាប់។



ទ្រីងធ្វើពីសំណាញ់

ទ្រីងធ្វើពីប្រស្នី

៦. ការថែទាំក្រោយពេលដាំ

៦.១. ការស្រោចស្រព

ប្រជាប្រភេទដំណាំ ដែលមិនសូវធន់ជាមួយភាពរាំងស្ងួតទេ តែវាក៏មិនត្រូវការ ទឹកជោគជាំខ្លាំងពេកទេ ប្រសិនបើសំណើមដីសើមខ្លាំងពេក ឬ មានភ្លៀងជោគជាំ អាចធ្វើ អោយប្រភេទដំណាំស្លឹកក្រហម ស្រពោនងាប់ដើមតែម្តង។ នៅរដូវវស្សា ការស្រោចស្រព

11	វីតាមីន B2	0.40 mg	--	0.105 mg	8%
12	វីតាមីន B1	0.26 mg	--	0.084 mg	7%
13	វីតាមីន A	24.59 IU	--	690 IU	23%
14	វីតាមីន C	100.71 mg	--	16.3 mg	27%
15	វីតាមីន E	--	--	--	--
16	វីតាមីន K	--	--	14.4 µg	12%

អេឡិចត្រូលីត

17	សូដ្យូម	--	--	6 mg	0.40%
18	ប៉ូតាស្យូម	--	--	209 mg	5.50%

ជាតិខនីជ

19	កាល់ស្យូម	216.96 mg	--	37 mg	3.70%
20	ទង់ដែង	--	--	--	--
21	ដែក	4.77 mg	--	1.04 mg	13%
22	ម៉ាញ៉េស្យូម	--	--	25 mg	6%

ល.រ.	បរិយាយ	ត្រីឡាច		សណ្តែកកូ	
		សារធាតុចិញ្ចឹម	(%)	សារធាតុចិញ្ចឹម	(%)
1	ថាមពល	666.14 Kca	--	31 Kcal	1.50%
2	កាបូណាអ៊ីដ្រាត	7.55 g	--	7.13 g	5.50%
3	ប្រូតេអ៊ីន	0.61 g	--	1.82 g	3%
4	សារធាតុធ្វើឱធាត់	0.15 g	--	0.34 g	1%
5	ខ្លាញ់Cholesterol	0 g	--	0 mg	0%
6	ជាតិសរសៃ	7.09 g	--	3.4 g	9%
វីតាមីន					
7	វីតាមីន B9	--	--	37 µg	9%
8	វីតាមីន B3	12.24 mg	--	0.752 mg	5%
9	វីតាមីន B5	--	--	0.094 mg	2%
10	វីតាមីន B6	--	--	0.074 mg	5.50%

ដោយប្រើប្រាស់ (កូនប្រឡាយ) តាមចន្លោះរង គឺធ្វើឡើងក្នុងរវាង 7-10 ថ្ងៃម្តង។ នៅក្នុង រដូវភ្លៀង ប្រសិនបើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ត្រូវបង្ហូរទឹកចេញពីថ្នាលជាបន្ទាន់ ការស្រោចស្រព ដោយប្រព័ន្ធច្រើប (Drip) គឺជាមធ្យោបាយមួយ ដែលសមស្រប នៅតំបន់ដែលមានបញ្ហា ខ្វះខាតទឹក និង ជួយអោយប្រមូល ដុះលូតលាស់ល្អធ្វើអោយដីធូរ មិនសូវដុះស្មៅ និងជួយ អោយដីសំបូរខ្យល់ និងផ្តល់ទឹក តាមតម្រូវការរបស់ប្រភេទរុក្ខជាតិ។

៦.២. ការកាត់តែងមែក

ដើម្បីអោយប្រមូល ទទួលបាននូវទិន្នផលខ្ពស់ ចាំបាច់គេ ត្រូវធ្វើការ កាត់មែក ដែលដុះចេញពីចំហៀង ដើមមេ ដែលជាមែកគ្មានប្រយោជន៍ ព្រោះមែកទាំងនោះ ពុំសូវ សំបូរផ្កាញីទេ។ ការកាត់នេះ ជំរុញអោយប្រមូល ផ្លែធំ វែងល្អ និងជួយកាត់បន្ថយសារ ធាតុដែលទៅចិញ្ចឹមមែក និងស្លឹក ដែលលូតលាស់គ្មានប្រយោជន៍ ខ្លែងដែលដុះចេញពីថ្នាំង ផ្នែកខាងក្រោម ចំនួន៧-១០ថ្នាំង ដំបូង មិនគួរទុកអោយវាដុះលូតលាស់ទេ ត្រូវកាត់វាចេញ និង កាត់ត្រួយដើមមេចេញ នៅពេលដែលវា វាវឡើងទ្រើងបានខ្ពស់ ដើម្បីជួយអោយមែក ចំហៀង ផ្នែកខាងលើ លូតលាស់បានល្អ និងកាន់ផ្លែបានច្រើនដូចគ្នា។



៧.សត្វល្អិត និងជំងឺលើដំណាំប្រះ

៧.១. សត្វល្អិតចង្រៃ

រុយទិចផ្លែ គឺជាបញ្ហាចំបងមួយ លើដំណាំប្រះ ហើយយើងមានការលំបាក ក្នុងការគ្រប់គ្រង ព្រោះវាពងដាក់ក្នុងផ្លែប្រះ ម្យ៉ាងទៀតក្នុងដំណាំកាលនេះយើងមិនអាចប្រើថ្នាំបានទេ។ រុយនេះ បំផ្លាញភាគច្រើន លើផ្លែប្រះ និង ផ្លែត្រសក់ ដោយពងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផ្លែជាចង្កោមៗ ប្រហែល១២ពង។ ដង្កូវរបស់វាមានរយៈពេលពី៥-៧ថ្ងៃ ហើយវារស់នៅក្នុងផ្លែប្រះ ភាពជាឱកាសឱ្យរបស់វា ជាទូទៅនៅក្នុងដី ឬ ក្នុងផ្លែ ប្រះ ប្រហែល ១០ថ្ងៃបន្តទៀត ទើបញ្ចាស់ជាមេចំណាស់។ ដើម្បីការពារ យើងអាចប្រើក្រដាស ឬ ថង់ប្លាស្ទិច មករុំផ្លែប្រះនៅអនុវត្តតាមវិធីនេះបានទាំងស្រុងទេ ដូច្នេះ យើងអាចប្រើអន្ទាក់អវិម្ពន ដើម្បីចាប់យកមេចំណាស់ មិនអោយវាបន្តពងដាក់ផ្លែប្រះ។ ម្យ៉ាងទៀត គេអាចប្រើថ្នាំសំរាប់បណ្តេញមេចំណាស់ មិនអោយវាហើរចូលក្នុងចំការប្រះបាន។



(ស្រាំងរុយចង្រៃប្រះ)

23	ម៉ង់កាណែស	0.250 mg	11%	0.079 mg	3.50%
24	ផ្លូស្វរ	--	--	24 mg	3%
25	ស័ង្កសី	0.16 mg	1%	0.20 mg	2%

Phyto-nutrients

26	ការ៉ូតេនបៃតង	190 µg	--	45 µg	--
27	ការ៉ូតេនអាល់ហ្វា	185 µg	--	26 µg	--
28	លុយតេអ៊ីន	170 µg	--	23 µg	--

11	វីតាមីន B2	0.037 mg	3%	0.033 mg	3%
12	វីតាមីន B1	0.039 mg	3%	0.027 mg	2%
13	វីតាមីន A	27 IU	1%	105 IU	3.50%
14	វីតាមីន C	2.2 mg	3.50%	2.8 mg	4.50%
15	វីតាមីន E	0.30 mg	2%	0.03 mg	0%
16	វីតាមីន K	3.5 µg	3%	16.4 µg	13.60%
អេឡិចត្រូលីត					
17	សូដ្យូម	2 mg	0%	2 mg	0%
18	ប៉ូតាស្យូម	230 mg	5%	147 mg	3%
ជាតិខនិជ					
19	កាល់ស្យូម	9 mg	1%	16 mg	1.60%
20	ទង់ដែង	0.082 mg	9%	--	--
21	ដែក	0.24 mg	3%	0.28 mg	3.50%
22	ម៉ាញ៉េស្យូម	14 mg	3.50%	13 mg	3%

៧.២. ការគ្រប់គ្រងជំងឺ និងសត្វល្អិតចង្រៃ ៖

៧.២.១ ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រៃ

ក. អណ្តើកមាសកខ្ចីស៊ីស្លឹក៖

វិធានការគ្រប់គ្រង និងកំចាត់

- សំអាតស្មៅនៅក្នុងចំការ
- ក្លរីបាលអោយស្អាតល្អ(ពី៥-៧ថ្ងៃ)
- ដាំដំណាំផ្លាស់ វី ប្រើថ្នាំកសិកម្មផ្សំពីរុក្ខជាតិ
- ករណីធ្ងន់ធ្ងរប្រើថ្នាំគីមីកសិកម្ម

+ Dragon 20 - 25 សេសេ/១៨ លីត្រទឹក

+ Abamectin(អាបាមិចទីន) 20 - 25 សេសេ/១៨ លីត្រទឹក

បាញ់ចន្លោះពេល ៧ - ១០ថ្ងៃម្តង រយៈពេល ២-៣ដង បាញ់អោយសព្វកន្លែង ចំគ្រុយខ្លីៗ (បាញ់នៅពេលព្រឹក) បញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំមុនពេលប្រមូលផល ១០ - ១៥ថ្ងៃ ។

ខ. ទ្រីបជញ្ជក់ស្លឹក

វិធានការគ្រប់គ្រង និងកំចាត់

- សំអាតស្មៅនៅក្នុងចំការ
- ប្រើថ្នាំពុលផ្សំពីរុក្ខជាតិ
- គ្របកៅស៊ូប្លាស្ទិកលើរង ដកដើមដែលរលួយចោល រក្សារដីអោយសើម
- ករណីធ្ងន់ធ្ងរប្រើថ្នាំពុលគីមី

+ Abamectin 20 - 25 សេសេ/១៨ លីត្រទឹក

បាញ់ចន្លោះពេល ៧ - ១០ថ្ងៃម្តង រយៈពេល ២ - ៣ ដង បាញ់អោយសព្វកន្លែង ចំគ្រុយខ្លីៗ (បាញ់នៅពេលព្រឹក) បញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំមុនពេលប្រមូលផល ១០ - ១៥ថ្ងៃ ។

- ប្រើថ្នាំអាតតារ៉ា (Actara) ឬថ្នាំអាបាមីថីន ទៅតាមកំរិតណែនាំរបស់ស្ថាប័ន

គ. ថែទាំ

វិធានការគ្រប់គ្រង និងកំចាត់

- សំអាតស្មៅនៅក្នុងចំការ
- ដាំដំណាំមានក្លិនលាយជាមួយប្រះ
- ប្រើថ្នាំពុលផ្សំពីរុក្ខជាតិ
- ករណីធ្ងន់ធ្ងរប្រើថ្នាំពុលគីមី

+ Supracide 10 - 25 សេសេ/១៨ លីត្រទឹក

+ Abamectin 20 - 25 សេសេ/១៨ លីត្រទឹក

បាញ់ចន្លោះពេល ៧ - ១០ថ្ងៃម្តង រយៈពេល ២ - ៣ ដង បាញ់អោយសព្វកន្លែង
ចំក្រុយខ្លីៗ (បាញ់នៅពេលព្រឹក) បញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំមុនពេលប្រមូលផល ១០ - ១៥ថ្ងៃ ។

ឃ. ស្រាវជ្រាវ ឬ រុករានរុករាន

វិធានការគ្រប់គ្រង និងកំចាត់

- សំអាតស្មៅនៅក្នុងចំការ
- ប្រមូលនឹងបេះយកផ្លែដែលបំផ្លាញចោល
- ប្រើថ្នាំពុលផ្សំពីរុក្ខជាតិ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ៥)

ឧបសម្ព័ន្ធ៣

តារាងវិភាគសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងបន្លែ ១០០ក្រាម

លរ.	បរិយាយ	ប្រះ		ត្រសក់	
		សារធាតុចិញ្ចឹម	(%)	សារធាតុចិញ្ចឹម	(%)
1	ថាមពល	24 Kcal	1%	15 Kcal	<1%
2	កាបូហ៊ីដ្រាត	5.7 g	4%	3.63 g	3%
3	ប្រូតេអ៊ីន	1 g	2%	0.65 g	1%
4	សារធាតុធ្វើឱ្យឆាត់	0.19 g	1%	0.11 g	0.50%
5	ខ្លាញ់ Cholesterol	0 mg	0%	0 mg	0%
6	ជាតិសរសៃ	3.40 g	9%	0.5 g	1%
វីតាមីន					
7	វីតាមីន B9	22 µg	5.50%	7 µg	2%
8	វីតាមីន B3	0.649 mg	4%	0.098 mg	<1%
9	វីតាមីន B5	0.281 mg	6%	0.259 mg	5%
10	វីតាមីន B6	0.084 mg	6.50%	0.040 mg	3%



ចែខ្មៅ



ចែសបៃតង



ស្រីងសណ្តែកពិណបៃតង



ដង្កូវស៊ីផ្កា និង ស៊ីផ្លែ



ដង្កូវយោលទោង



ដង្កូវស៊ីបណ្តាល

៧.២.២ ជំងឺលើដំណាំ

ក. ជំងឺស្រពោនដើម

វិធានការគ្រប់គ្រង និងកំចាត់

យើងអាចការពារនឹងកំចាត់ជំងឺនេះបានដោយបណ្តុះកូននៅក្នុងកន្លែងដែលយើងបានសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងដី។ ប្រសិនបើ វាធ្វើការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរ យើងអាចប្រើថ្នាំមេតាក់សីល (Methaxyl) ឬថ្នាំ ហ្វូសេទីល (Fosetyl-AI) មកបាញ់ ការពារនៅលើស្លឹក និងនៅលើដីគឺអាចកាត់បន្ថយជំងឺនេះ ។

- ករណីធ្ងន់ធ្ងរប្រើថ្នាំពុលគីមី
- + Tung Grerin 50EC 10 - 25 សេសេ/១៨ លីត្រទឹក
- + Abamectin 20 - 25 សេសេ/១៨ លីត្រទឹក

បាញ់ចន្លោះពេល ៧ - ១០ថ្ងៃម្តង រយៈពេល ២ - ៣ ដង បាញ់អោយសព្វកន្លែងចម្រុយខ្លីៗ (បាញ់នៅពេលព្រឹក) បញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំមុនពេលប្រមូលផល ១០ - ១៥ថ្ងៃ ។

ខ. ជំងឺស្រិតទុំលើដំណាំ

វិធានការគ្រប់គ្រង និងកំចាត់

- ជ្រើសរើសពូជផ្ទុក និងដាំដំណាំឆ្លាស់
- បង្កើនការស្រោចទឹកនៅពេលអាកាសធាតុក្តៅ
- ប្រើថ្នាំពុលផ្សំពីរុក្ខជាតិ
- ករណីធ្ងន់ធ្ងរប្រើថ្នាំពុលគីមី

- + Ridomy 30 - 40 ក្រាម/១៨ លីត្រទឹក
- + Apine 2 កញ្ចប់ 20 ក្រាម/១៨ លីត្រទឹក
- + Danonil 30 - 40 ក្រាម/១៨ លីត្រទឹក

បាញ់ចន្លោះពេល ៧ថ្ងៃម្តង រយៈពេល ២ - ៣ ដង បាញ់អោយសព្វកន្លែងចំគ្រុយ ខ្ចីៗ (បាញ់នៅពេលព្រឹក) បញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំមុនពេលប្រមូលផល ៧-១០ ថ្ងៃ ។

គ. ជម្ងឺស្លឹកឈូងស្លឹក ឬ ជ្រៃ

វិធានការគ្រប់គ្រង និងកំចាត់

- ជ្រើសរើសពូជផង់ គ្រាប់ដែលមានថ្នាំការពារផ្សិត សំអាតស្មៅនៅក្នុងចំការ
- ប្រើថ្នាំពុលផ្សំពីរុក្ខជាតិ
- ករណីធ្ងន់ធ្ងរប្រើថ្នាំពុលគីមី

- + Chlorothalonil 30 - 40 ក្រាម/១៨ លីត្រទឹក
- + Thiophenate methyl 30 - 40 ក្រាម/១៨ លីត្រទឹក
- + Mancozeb 30 - 40 ក្រាម/១៨ លីត្រទឹក

បាញ់ចន្លោះពេល ៧ ថ្ងៃម្តង រយៈពេល ២ - ៣ ដង បាញ់អោយសព្វកន្លែងចំគ្រុយ ខ្ចីៗ (បាញ់នៅពេលព្រឹក) បញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំមុនពេលប្រមូលផល ៧-១០ ថ្ងៃ ។

ឃ. ជម្ងឺស្រពោនសើម (ពុកឬស)

វិធានការគ្រប់គ្រង និងកំចាត់

- ជ្រើសរើសពូជផង់ ដាំដំណាំផ្លាស់
- លើករងអោយបានខ្ពស់ៗហើយរងមានគ្របកៅស៊ូប្លាស្ទិច
- ប្រើថ្នាំពុលផ្សំពីរុក្ខជាតិ

-២២-

ឧបសម្ព័ន្ធ២

សត្វល្អិតចម្លែកនៅក្នុងចំការ

យើងចង់ឱ្យស្រូវចម្រើនលឿនបន្ថែមមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេ។



Aphids ជាពពួកសត្វល្អិតដែលខ្លួនរបស់វាទន់។ វាស៊ី រុក្ខសនៅក្នុងពន្លករុក្ខជាតិ ស្លឹក ក្រពុំផ្កា និងផ្កា ។



ចៃ ខ្លួនទន់គ្របដណ្តប់ដោយក្រមួនពណ៌ស ពណ៌ត្នោត និងពណ៌ប្រផេះ វាមានទំហំតូចក្រៃលែង ហើយវាស៊ីរុក្ខស ។



ពពួកអណ្តើកមាស កខ្លីមានអុច១២ចំណុច និងមួយទៀត មានអុច២៨ចំណុច វាជាពពួកសត្វល្អិតចង្រៃ



រុយ ទិចផ្លែវាបំផ្លាញដំណាំអំបូរគ្រួសារ ម្រះ ត្រសក់។ វាមិនមែនពពួកស្រាំងទេ តែកសិករភាគច្រើនហៅថា ស្រាំងទិចផ្លែ ។

-៤១-



Dragonflies កន្ទុយ ពពួកវាមានជាង ៨០ ប្រភេទ នៃកន្ទុយគេអាចកំណត់ពពួកវាបានដោយមានខ្លួនវែង មានភ្នែកធំមានស្លាបផ្ទាច់៤។ ពណ៌របស់វាមានការ ប្រែប្រួលតាមទំហំ ហើយកូនញាស់គេសង្កេតឃើញ នៅក្នុងទឹក។ ពពួកវាស៊ីមូស ពពួកសត្វល្អិត ដែលមក ជញ្ជក់រុក្ខស និងសត្វល្អិតផ្សេងៗទៀត



Honeybees សត្វឃ្មុំ គឺមានប្រយោជន៍ក្នុងដំណើរ លំអងផ្កាដោយនៃរុក្ខជាតិជាច្រើន។ វាពេញវ័យមាន ទំហំ2/3 inch វាមានរោមទន់ វាមានពណ៌មាស លាយពណ៌ខ្មៅ ខ្លួនឆ្លុត ហើយស្លាបផ្ទាច់៤។ សត្វឃ្មុំ គេអាចសម្គាល់វាចូលចិត្តលំអងផ្កាពណ៌លឿង ពពួកវា ចាប់យកលំអងដោយដឹងរបស់វា ការលូតលាស់ ផ្កាត្រូវបានសត្វឃ្មុំជួយជំរុញ។

៨. ការប្រមូលផល

ការប្រមូលផលពូជព្រះ អាស្រ័យទៅតាមពូជនីមួយៗ ជា ទូទៅ គេអាចប្រមូល ផលព្រះ បាននៅពេលគេឃើញ ផ្លែរបស់វាមានក្រឡាវីក ផ្លែធំស្មើ ពណ៌បៃតងស្រស់ និង រលោង។ គេអាចប្រមូលផលបានក្នុងរយៈពេលយូរ ទិន្នផលជាមធ្យមពី ១៥-១៨ តោន /ហិកតា ចំពោះពូជប្រពៃណី និង ពី ២៥-៥០ តោន/ហិកតា ចំពោះពូជនាំចូល។ ការប្រមូល ផល គេច្រើនធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹក នៅចន្លោះពីម៉ោង ៧ព្រឹក រហូតដល់ ម៉ោង១០ព្រឹក និង នៅពេលល្ងាចត្រជាក់។ គេប្រមូលផលរៀងរាល់ថ្ងៃ ឬ ពីរថ្ងៃម្តងដោយប្រើកន្ត្រៃ ឬកាំបិត មុតកាត់ទងរួចយកផ្លែព្រះទៅតំរៀបដាក់ក្នុង ខែង ឬកញ្ជ្រៃ ដោយធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ផ្លែព្រះ ជា ៣ប្រភេទគឺ ប្រភេទលេខ១ ផ្លែធំវែង ប្រភេទលេខ២ ផ្លែមធ្យម និងប្រភេទលេខ៣ផ្លែតូច។ ផ្លែព្រះមិនអាចទុកយូរថ្ងៃទេ ប្រសិនបើ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា គេអាចរក្សាទុកបាន៣-៤ថ្ងៃ ដូចនេះ បន្ទាប់ពីប្រមូលផលរួចត្រូវប្រញាប់យកទៅលក់នៅទីផ្សារ។



៩. ការតាមដានស្រែកសោធន៍ និងប្រមូលទិន្នន័យ:

៩.១. ទិន្នន័យរបស់ដំណាំដែលត្រូវប្រមូលរួមមាន

- ឈ្មោះដំណាំ និងប្រភពពូជ - ផ្ទៃដីដាំដុះសរុប
- ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំ បណ្តុះនិងដាំកូនដំណាំ
- ចំនួនគុម្ពដំណាំ ដោយរាប់ក្នុងដំណាក់កាលប្រមូលផលលើកដំបូង
- ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំដាក់ជីបំប៉ន និងបរិមាណដែលប្រើ
- ទិន្នផល ប្រាក់ចំណូល និងថ្លៃ.ខែ.ឆ្នាំ ដែលបានប្រមូលផលក្នុងមួយលើកៗ
- វិធីសាស្ត្រស្រោចស្រព
- ប្រភេទសត្វល្អិត និងជំងឺដែលកើតមានច្រើនជាងគេ

៩.២. ទិន្នន័យផលិតកម្ម

- កត់ត្រារាល់ការចំណាយលើសម្ភារផលិតកម្មដោយរាយមុខចំណាយ និងតម្លៃសរុបសម្ភារនីមួយៗ ដែលបានទិញសំរាប់ដំណើរការផលិតកម្ម។
- តម្លៃប្រតិបត្តិនៅលើទីផ្សារ ដូចជាដឹកជញ្ជូន វេចខ្ចប់ ពន្ធលក់ដូរជាដើម។
- តម្លៃពលកម្ម ឧទាហរណ៍ ជួលពលកម្ម រៀបចំដី បាញ់ថ្នាំ....។ល។



Hover Flies វាពេញវ័យរវាងដូចឃ្មុំតូចពោះឆ្មុត មានចំណុចប្រផេះនៅលើក្បាល ផ្កាហើរទៅរកផ្កាមួយទៀតដើម្បីបង្កាត់ជាមួយលំអង និង ទឹកដមផ្កា កូនញាស់ស៊ីពពួកសត្វល្អិតជញ្ជក់រុក្ខស កន្លែងចង្អៀត ដែលសត្វចង្រៃមិនអាច ទៅដល់ហើយវាជាសត្វពិសេស ដែលមានប្រយោជន៍ វាជាសត្វមានប្រយោជន៍សកម្មជាងគេ វាបាននាំលំអងទៅលើទងផ្កាដើម្បីអោយផ្លែវិកជំនិងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាងមុន។



Spiders ពីងពាង សត្វពីងពាងទាំងអស់វាចិញ្ចឹមជីវិតដោយសត្វល្អិត ហើយវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារកត្តាផ្សេងៗ។ ជាធម្មតាសត្វពីងពាងគេឃើញវានៅក្នុងសួនច្បារ ហើយពួកវាគ្មានពិស។ ដើមឈើធំនិងគំនរចំបើងជាជម្រកនិងធ្វើឱ្យចំនួនពីងពាងកើនឡើងយ៉ាងលឿននៅក្នុងសួនបន្លែ ។



Tachini Flies រុយខៀវ ទោះបីជាយើងឃើញ វាហាក់ដូចជារុយនៅតាមផ្ទះក៏ដោយរុយខៀវវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ វាជាសត្វនៃដង្កូវកាត់ស្លឹក ដង្កូវមេអំបៅ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ សត្វល្អិតមានប្រយោជន៍នៅក្នុងចំការ

ជម្រើសមួយដ៏ល្អដើម្បីការពារស្ពានដំណាំគឺការប្រើសត្វល្អិតធម្មជាតិ។ ការដាំរុក្ខជាតិ មានលំអង និងទឹកដមផ្កា គឺបានផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់សត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ ដាំស្ពាន សរីរាង្គជាគោលការណ៍គ្រឹះ ហើយជាវិធីមួយទៅអនាគតធ្វើអោយបរិស្ថានវិទ្យានានាកើន ឡើងនៃស្ពានរបស់អ្នក។



Ladybugs អណ្តើកមាស មានរាងមូល ខ្លួនរបស់វាមានពណ៌ ទឹកក្រូច វាជាសត្វល្អិតមួយក្នុងចំណោមសត្វល្អិតជាង ៤០០ ប្រភេទ ខ្លួនរាងមូល ដែលមាននៅអាមេរិចខាងជើង។ អណ្តើក មាស ភាគច្រើនពេញវ័យនិងមានវដ្តជីវិតពេញលេញ ហើយវា ស៊ីពពួកសត្វល្អិតដែលមកជញ្ជក់រុក្ខស និងសត្វល្អិតដែលមាន ខ្លួនទន់ៗ អណ្តើកមាសពេញវ័យវាចូលចិត្តទឹកដម និងលំអងផ្កា ពួកវាត្រូវតែស៊ីមុនពេលវាបន្តពូជ។



Lacewings មានពណ៌បៃតងស្រាល ឬពណ៌ត្នោត
Lacewings ពេញវ័យមានលក្ខណៈសំគាល់ដូចជា រាងធំ ស្លាបរាងសរសៃ វាស៊ីទឹកដមផ្កា ។ វាមានវដ្តជីវិតពេញលេញ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជាសត្វ predators (អ្នកជញ្ជក់ឈាម) វាស៊ីពពួកសត្វល្អិតដែលមកជញ្ជក់រុក្ខស thrips ចៃ មេអំបៅតូចៗ និងពពួកសត្វល្អិតចង្រៃតូចៗ ។

ដំណាំត្រឡាច

- ត្រឡាច ដែលអាចទទួលបានផលដំបូងក្នុងរយៈពេលពី ៥៥ - ៦០ថ្ងៃ ក្រោយការ ដាំដុះ។

ចំពោះការរៀបចំដី និងការធ្វើវង់គឺធ្វើដូចដាំដំណាំ ត្រសក់ដែរ

១. របៀបបណ្តុះកូន

- សាបគ្រាប់នៅក្នុងកន្លែង ឬថាសបណ្តុះកូន ឬសម្ភារក្នុងស្រុកអាចជំនួសបាន
- ល្បាយដីបណ្តុះកូន ត្រូវដុតកំដៅសម្លាប់មេរោគ មុនពេលយកវាមកប្រើ
- ប្រើថ្នាំការពារជំងឺផ្សិត លាយជាមួយគ្រាប់ពូជ មុនពេលយកវាទៅបណ្តុះ
- កូនសំណាបអាចយកវាទៅដាំឈើវង់បានពេលវាបានអាយុ ១៥ - ២០ថ្ងៃ។

២. របៀបដាំដុះ

- ដាំ ២ជួរ ក្នុងមួយរង ហើយចន្លោះគុម្ព 0.5m (ស្មើនឹងកន្លះម៉ែត្រ) ហើយដាំនៅ តាមចំហៀងរង

រូបភាពទី១៤៖ ការធ្វើទ្រីងត្រឡាច



៣. ការប្រើប្រាស់ដីបំប៉នក្រោយដាំ

- **ដីបំប៉នលើកទី១ ប្រើជី FDP (ជីគ្រាប់ធំ)** ចំនួន១គ្រាប់ ក្នុងមួយគុម្ព ដាក់បង្កប់ ក្នុងដីជំរៅ និងចម្ងាយ 10cm ពីគុម្ពដំណាំ ហើយដាក់នៅពេលពូនគល់ដំបូង ឬ ពេលដាក់ ទ្រីង។

- **ដីបំប៉នលើកទី២ ប្រើជី FDP (ជីគ្រាប់ធំ)** ចំនួន១គ្រាប់ ក្នុងមួយគុម្ព ដាក់បង្កប់ ក្នុងដីជំរៅ និងចម្ងាយ 10cm (ស្មើនឹង១តឺក) ពីគុម្ពដំណាំ ហើយដាក់នៅពេលត្រឡាចចេញ ផ្កាដំបូង។

- **ដីបំប៉នលើកទី៣ ប្រើជីអ៊ុយរ៉េ ក្នុងកម្រិត ៣ក្រាមក្នុងមួយគុម្ព ដាក់បង្កប់ ក្នុងដី កែវគុម្ពដំណាំ ក្រោយពេលប្រមូលផលលើកដំបូងរួច។**

រូបភាពទី១៤៖ ការដាក់ដីបំប៉ន



ដើម្បីងាយស្រួល ក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ ក្នុងពេលបេះផ្លែ ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ គឺ ជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់បង្កើនតម្លៃបន្ថែមទៅលើផលិតផល និង ជាវិធីទាក់ទាញ អ្នកទិញអោយចង់ទិញផលិតផលរបស់យើងផង។ ក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ យើងអាចចែក ជា ៣ប្រភេទគឺ

- ✓ ប្រភេទទី១៖ ជាផ្លែដែលខ្លី មូល រលោង ត្រង់ល្អ ហើយកូររបស់វា មាន ប្រវែងចាប់ពី ៤៥ស.ម ឡើងទៅ និងគ្មានស្នាមបំផ្លាញនៅលើផ្លែ។
- ✓ ប្រភេទទី២៖ ជាផ្លែដែលមិនចាស់ជ្រុលពេក អាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បាន ហើយកូររបស់វាមានប្រវែងមិនលើសពី ៤៥ស.ម ។
- ✓ ប្រភេទទី៣៖ ជាផ្លែដែលសល់ពីការចាត់ថ្នាក់ទាំង២ប្រភេទខាងលើ។ យើង មិនអាចយកទៅលក់ឱ្យអ្នកបរិភោគបានទេ តែអាចយក មក ធ្វើជាចំណីសត្វ បាន។

ក្រោយពេលធ្វើចំណាត់ថ្នាក់រួច ត្រូវចងវាជាបាច់តូចៗ ដើម្បីអោយអ្នកទិញ ងាយ ស្រួលត្រួតពិនិត្យ និង មានចិត្តចង់ទិញផលិតផល។ ដើម្បីកុំអោយសណ្តែកស្រកទំនន់ ដោយសារការបាត់បង់ជាតិទឹកចេញពីផ្លែ យើងត្រូវរក្សាវាទុកនៅកន្លែង ដែលមាន សីតុណ្ហភាពត្រជាក់ ដោយយកវាមកដាក់តំរៀបជាគំនរតូចៗល្មម នៅលើកំរាលរាបស្មើ ហើយយកកន្សែងដែលជក់ទឹកល្អទៅជ្រលក់ទឹកអោយសើមរួចយកមកគ្របពីលើគំនរ សណ្តែកនីមួយៗ ដើម្បីការពាររំហួតចំហាយទឹកចេញពីផ្លែសណ្តែក។

៨. ការប្រមូលផលសណ្តែកទ្រីង

ក្រោយពេលសណ្តែកទ្រីង បានអាយុ៥០ ទៅ៦០ថ្ងៃ យើងអាចប្រមូលផល លើក ទីមួយបាន សំរាប់ការប្រមូលផលជាបន្តបន្ទាប់អាចធ្វើឡើងនៅពេលដែលផ្លែសណ្តែក ស្ថិត ក្នុងដំណាក់កាលខ្ចី មិនទាន់មានគ្រាប់ពេញលេញ ហើយកូររបស់វាស្រឡូនល្អ មិនមាន ស្នាមកំពក គ្រាប់មានលក្ខណៈដូចជាខ្សែមួយស័ស។ ពេលអនុវត្តការប្រមូលផល យើងត្រូវប្រលេះយកផ្លែចេញពីទងរបស់វាម្តងមួយៗ យកល្អយើងគួរប្រើកាំបិត ឬ កន្ត្រៃ សំរាប់កាត់ផ្លែចេញពីទង។ ប្រសិនបើយើងបេះផ្លែដោយបន្ទាល់ទុកសណ្តែងផ្លែ និង ផ្នែកខ្លះ នៃផ្លែឱ្យនៅជាប់ជាមួយទង ផ្កា វានឹងធ្វើអោយសណ្តែកពន្យាពេលចេញផ្កានៅពេលបន្ទាប់។ ត្រូវបេះផ្លែដោយថ្មមដៃ ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងលើចង្កៀង ឬ រមួលទងផ្កា។

ដើម្បីងាយស្រួល ក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ ក្នុងពេលបេះផ្លែ យើងត្រូវចង់វា ជាដុំៗ ប៉ុនមួយក្តាប់ដៃដោយ ខ្សែចំណងផ្សេងៗ ដែល អាចរកបាន។ យើងត្រូវប្រមូលផលនៅ ពេលល្ងាចត្រជាក់ ឬ មុនពេលថ្ងៃលិច រាល់ការបេះមួយលើកៗ ត្រូវបេះទាំងផ្លែដែល ចាស់ជ្រុល ឬ ផ្លែដែលមិនបានការចេញពីចំណាយអស់ ព្រោះវាក៏ជាប្រភព ចំណងជំងឺ ផ្សេងៗ មកលើផ្លែជំនាន់ក្រោយ ជាពិសេសជំងឺផ្សិត។ ប្រសិនបើយើងដាំដុះវា ត្រឹមត្រូវ តាមបច្ចេកទេស និងថែទាំបានល្អ នោះសណ្តែកទ្រីងអាចផ្តល់ផលចាប់ពី ១៨ ទៅ ២២ តោន/ហិ.ត។

៩. ការគ្រប់គ្រងជំងឺ និងសត្វល្អិតចង្រៃ:

៩.១ ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រៃ

ក. រុយស

វិធានការគ្រប់គ្រង និងកំចាត់

- ប្រើបន្ទះប្លាស្ទិចពណ៌លឿង ធ្វើអន្ទាក់សម្រាប់ទាក់ទាញមេចំណាស់ដោយមាន លាបថ្នាំឬប្រេងស្អិតៗ
 - ប្រើថ្នាំពុលផ្សំពីរុក្ខជាតិស្តោមកបាញ់លើត្រឡាច នៅក្នុងដំណាក់កាលពងរបស់ វាមិនទាន់ញាស់
 - ប្រើថ្នាំអាកតារ៉ា (Actara) ឬ ថ្នាំអាបាមិចទីនទៅតាមកំរិតណែនាំរបស់ស្លាកថ្នាំ
- ខ. ថែបែត និងថែក្រហម**

វិធានការគ្រប់គ្រង និងកំចាត់

- ប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលដែលផ្សំពីរុក្ខជាតិលាយជាមួយទឹក ហើយបាញ់រៀងរាល់ ១ សប្តាហ៍ម្តង ដើម្បីការពារការបំផ្លាញ ។

៩.២ ជំងឺលើដំណាំ

ក. ជំងឺស្រពោនសើម

វិធានការគ្រប់គ្រង និងកំចាត់

យើងអាចការពារនិងកំចាត់ជំងឺនេះបានដោយបណ្តុះកូននៅក្នុងកន្លែងដែលយើង បានសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងដីរួច។ ប្រសិនបើ វាធ្វើការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរ យើងអាចប្រើថ្នាំ មេតាក់សីល (Methaxyl) ឬថ្នាំ ហ្វូសេទីល (Fosetyl-AI) មកបាញ់ការពារនៅលើស្លឹក និង នៅលើដី គឺអាចកាត់បន្ថយជំងឺនេះ ។

៥. ការស្រោចស្រព និងគ្រប់គ្រងជីវិត

ត្រូវស្រោចស្រពដំណាំ ឱ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលា និងរក្សាសំណើមដីឱ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយសមស្របតាមប្រភេទដី។ ចំពោះប្លង់ពិសោធន៍ដែលប្រើកៅស៊ូប្លាស្ទិចគ្របរងយើងអាចស្រោចស្រពតាមវិធីសាស្ត្របង្ហូរទឹកតាមចន្លោះរងនីមួយៗបាន ហើយក្នុងករណីដែលមានភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ ការស្រោចស្រពគឺពុំចាំបាច់ឡើយ ហើយបរិមាណទឹកដែលត្រូវស្រោចគឺពី ៣ - ៥លីត្រ សំរាប់ផ្ទៃដីដាំដុះចំនួន១ម៉ែត្រការ៉េ។

៦. ការគាមដាច់ស្រែពិសោធន៍ និងប្រមូលទិន្នន័យ

៦.១. ទិន្នន័យរបស់ដំណាំដែលត្រូវប្រមូលរួមមាន

- ឈ្មោះដំណាំ និងប្រភពពូជ - ផ្ទៃដីដាំដុះសរុប
- ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំ បណ្តុះ និងដាំកូនដំណាំ
- ចំនួនគុម្ពដំណាំ ដោយរាប់ក្នុងដំណាក់កាលប្រមូលផលលើកដំបូង
- ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំ ដាក់ដីបំប៉ន និងបរិមាណដែលប្រើ
- ទិន្នផល ប្រាក់ចំណូល និងថ្លៃ.ខែ.ឆ្នាំ ដែលបានប្រមូលផលក្នុងមួយលើកៗ
- វិធីសាស្ត្រស្រោចស្រព
- ប្រភេទសត្វល្អិត និងជំងឺដែលកើតមានច្រើនជាងគេ

៦.២. ទិន្នន័យផលិតកម្ម

- កត់ត្រារាល់ការចំណាយ លើសម្ភារៈផលិតកម្មដោយរាយមុខចំណាយ និង តម្លៃសរុបរបស់សម្ភារៈនីមួយៗដែលបានទិញសម្រាប់ដំណើរការផលិតកម្ម។
- តម្លៃប្រតិបត្តិនៅលើទីផ្សារ ដូចជាដឹកជញ្ជូន វេចខ្ចប់ ពន្ធលក់ដូរជាដើម។
- តម្លៃពលកម្ម ឧទាហរណ៍ ជួលពលកម្មរៀបចំដី បាញ់ថ្នាំ....។ល។

៧. ជំងឺ និង សត្វល្អិត លើសណ្តែក

៧.១. ជំងឺរលួយគល់កូនសណ្តែក

គឺជាប្រភេទ ជំងឺផ្សិតម្យ៉ាង ដែលកើតនៅលើសណ្តែក នៅក្នុងដំណាក់កាលដុះលូតលាស់ដំបូង រហូតដល់មុនពេលវាចេញផ្កាជាពិសេស នៅពេលដែល មានអាកាសធាតុត្រជាក់ និងសំណើមបរិយាកាសខ្ពស់។ យើងអាចធ្វើការការពារជំងឺនេះ ដោយលាយថ្នាំកាប់តាំង ជាមួយគ្រាប់ពូជ មុនពេលយកទៅដាំ ហើយក្នុងករណីយកកើតមានឡើងត្រូវបន្ថយការស្រោចស្រព និង បាញ់ថ្នាំព្យាបាល ជំងឺផ្សិតដូចជា ពពួក ម៉ង់ កូហ្សិប ជាដើម ។



៧.២. សត្វល្អិតចង្រៃលើសណ្តែកច្រើន

សត្វល្អិត ដែលបំផ្លាញសណ្តែកច្រើន ខ្លាំងក្លាជាងគេគឺ ចៃ មមាច រុយដង្កូវស៊ីផ្កា និង ស៊ីផ្លែ ដង្កូវស៊ីរូងកោសិកាស្លឹក។ល។ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ២) ដើម្បីការពារ យើងត្រូវប្រើថ្នាំពុលដែលផ្សំពីស្ពោ (ប្រេងគ្រាប់ស្ពោ ស្លឹកស្ពោ សំបកស្ពោ...) បាញ់ការពារឱ្យបានរៀងរាល់សប្តាហ៍។ ក្នុងករណីមានការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរត្រូវ ប្រើថ្នាំពុលគីមីកសិកម្ម គឺជាជំរើសចុងក្រោយ។ មានថ្នាំពុលមួយចំនួន ដែលមាន ប្រសិទ្ធភាព ដូចជាថ្នាំអាសេហ្វាត acephate ថ្នាំស្ពីណូសាត spinosad ថ្នាំអ៊ីមីដាក្លូប្រីត imidacloprid និងថ្នាំណាល់ naled និង ថ្នាំ Abamectin។ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ៤)

៦.២. ការដាក់ច្រើងសណ្តែក

ក្រោយពេលជ្រោយដី និងដាក់ជីបំប៉នរួចរាល់ហើយ យើងត្រូវស្រោចទឹកអោយជោគដី (ក្នុងរដូវប្រាំង) មុននឹងរៀបចំច្រើង។ ច្រើងសណ្តែក អាចជាមែកឬស្បី ឬមែកឈើ ដែលមានបណ្តោយប្រវែង២.៥ម៉ែត្រ និងជាមែកឈើទោល ហើយគ្មានបន្លា។ ម្យ៉ាងទៀត យើងអាចយកខ្សែជ័រមួយចំនួនមកធ្វើច្រើងក៏បាន។

៦.៣. ការជួយទប់ស្កាត់សណ្តែករង្វងច្រើង

ពូជសណ្តែកមួយចំនួនអាចបែកមែកយ៉ាងច្រើននៅតាមផ្ទាំងផ្នែកខាងក្រោម ហើយមែកទាំងនេះ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ សំរាប់កំណត់នូវទិន្នផលរបស់សណ្តែក។ ប្រសិនបើ យើងទុកអោយវាវិវត្តទៅលើច្រើង វានឹងធ្វើអោយយើងខាតបង់ទិន្នផលជាមិនខាន ហើយការបែកមែករបស់សណ្តែក គឺមានចំនួនមួយកំណត់ដែរ។ ដូច្នេះ ក្នុងដំណាក់កាលសណ្តែកវាវិវត្តច្រើងជាលើកដំបូង យើងត្រូវស្បៀងព្យាយាមបង្វែរមែកសណ្តែកទាំងអស់ ដែលបានបែកចេញមកហើយវាបោះទងនៅលើដី ឬ វារឆ្លង ទៅកាន់ច្រើងដែលនៅរងផ្សេងមកចង ឬ រុំព័ទ្ធជាមួយច្រើងរបស់វាវិញ។ ដើម្បីអោយមែកដែលយើងយកមករុំនោះ អាចតោងជាប់ជាមួយច្រើងបាន យើងត្រូវរុំវាអោយស្របជាមួយនឹងទិសនៃទ្រូងចន្លាឡើយ។ កិច្ចការទាំងនេះ តម្រូវអោយយើងចំណាយពេលវេលាច្រើន ដែលជាទូទៅអ្នកដាំដុះមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាព ដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ ទាំងនេះទេ។

ជំនាវិស័យសណ្តែកច្រើង

សណ្តែកច្រើង *Vigna unguiculata* ជារុក្ខជាតិវល្លិ ស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារ *Fabaceae* វាមានប្រភពកំណើតមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ខ្លះបានអះអាងថា វាមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសចិន និងប្រទេសអេក្វាទ័រ។ តែថ្មីៗ នេះ គេបានសន្មតថាសណ្តែកច្រើង មានប្រភពដើមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិក ហើយបន្ទាប់មកបាន រាលដាលនៅពាសពេញតំបន់ត្រូពិច ។

១. លក្ខខណ្ឌនៃការដុះលូតលាស់

សណ្តែកច្រើងអាចដុះលូតលាស់លើដីច្រើនប្រភេទ និងមានប៉េហាស់ ចាប់ពី 5.5 ដល់ 7.5។ ប៉ុន្តែប្រភេទដីដែលធ្វើអោយវាដុះលូតលាស់ និង បង្កើនទិន្នផលបានច្រើន គឺជាប្រភេទដីល្បាប់ ឬ ដីល្បាយខ្សាច់មានជីជាតិ និង ច្រោះទឹកបានល្អ។ ហើយប៉េហាស់ ដែលល្អបំផុតសំរាប់ សណ្តែកច្រើង គឺក្នុងចន្លោះពី 5.5 រហូតដល់ 6.5។ ចំពោះសីតុណ្ហភាពវិញ សណ្តែកច្រើង មានភាពផុសរីកចម្រើនលឿនកំដៅថ្ងៃហើយនឹងភាពរាំងស្ងួតជាងដំណាំ ដទៃទៀត សីតុណ្ហភាពដី ដែលសមស្របសម្រាប់ដំណុះគ្រាប់គឺចាប់ពី 24-30°C ហើយសីតុណ្ហភាពសមស្របក្នុងតំណាក់កាលលូតលាស់គឺ 25-35°C។

២. ការជ្រើសរើសពូជ

ពូជជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងៗទៀត ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ នឹងកំណើននៃទិន្នផលរបស់សណ្តែក ប៉ុន្តែទីផ្សារក៏ជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ណាស់ដែរ សម្រាប់ បង្កើនប្រាក់ចំណូលពីការដាំដុះ។ ដូច្នេះអ្នកដាំដុះ ចាំបាច់ត្រូវតែជ្រើសរើសយកនូវពូជណា ដែលមានតម្រូវការនៅលើទីផ្សារ ទើបអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យ ពីការដាំដុះ ដំណាំនេះ។ ពូជសណ្តែកទ្រីង ដែលគេនិយមដាំ និង អ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្តទិញ គឺជា ប្រភេទសណ្តែក ដែលមានផ្លែពណ៌បៃតង ឬ ពណ៌បៃតងចាស់ ហើយក្លរែងៗ។ ចំពោះ សណ្តែកទ្រីងដែលមានផ្លែពណ៌ស ឬ បៃតងស្រាល អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើន មិននិយម ចូលចិត្តទិញយកទៅបរិភោគទេ។ ជាទូទៅ ក្នុងផ្ទៃដី១ហិកតា ត្រូវការបរិមាណពូជសរុប ចំនួន ៧ គ.ក្រ ឬ ០.៧ខាំ/១០០ម^២។



ពូជក្រូមហ៊ុនវ៉ិស-វ៉ិហ្វូស



ពូជក្រូមហ៊ុនត្រាំងណុង

៥. បច្ចេកទេសដាំដុះសណ្តែកទ្រីង

ដើម្បីអោយសណ្តែកដុះលូតលាស់ស្មើគ្នាល្អនៅពេលដាំលើកដំបូង យើងត្រូវដាំគ្រាប់ មួយចំនួននៅតាមចន្លោះជួរនៃរងនីមួយៗ ដើម្បីទុកសំរាប់គាស់យកទៅជួសនៅតាមរណ្តា ណាដែលមិនដុះ ក្រោយពេលដាំរួចភ្លាមៗ ដើម្បីអោយគ្រាប់សណ្តែកបន្តការបីតទឹក និង ឆាប់ដុះ។

៦. ការថែទាំសណ្តែកទ្រីង

៦.១. ការស្រោចស្រព

សណ្តែកទ្រីង គឺជាដំណាំដែលមិនសូវត្រូវការទឹកច្រើនប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែយើងចាំ បាច់ត្រូវធ្វើការស្រោចស្រពអោយបានទៀងទាត់។ ក្នុងរដូវវស្សា គេពុំសូវធ្វើការស្រោច ស្រពឡើយ ព្រោះមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប្រចាំ តែនៅពេលដែលឃើញថា រងសណ្តែកស្ងួតទឹក ហើយស្លឹករបស់វាស្ងួតស្រពោនដោយសារកំដៅថ្ងៃខ្លាំង ទើបយើងធ្វើការស្រោចស្រព។ ចំពោះវិធីសាស្ត្រ ស្រោចស្រព គឺធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្ហូរទឹកចូលតាមចន្លោះរងនីមួយៗ។ រាល់ការស្រោចស្រពមួយលើកៗ ត្រូវបញ្ចូលទឹកអោយបានកំពស់២/៣ នៃកំពស់រង ហើយ រយៈពេលនៃការស្រោចមួយលើកៗ គឺអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទដី និង ការប្រែប្រួល នៃ អាកាសធាតុ ក្នុងតំបន់ដែលបានដាំដុះ។

សណ្តែកទ្រីង ជាដំណាំដែលអាចស្រូបយកជីអាសូតពីក្នុងបរិយាកាស បាន ដោយខ្លួនឯង ព្រោះនៅលើឬសរបស់វាមានបាត់តេរីម្យ៉ាង ឈ្មោះថា រីសូប្យូម ដែលជា អ្នកចាប់យកអាសូតមកអោយ ឬសសណ្តែក ដូច្នេះ យើងមិនចាំបាច់ប្រើជីអាសូត ច្រើន សំរាប់បំប៉នទេ ព្រោះវានាំអោយយើងខាតបង់ថវិកាឥតប្រយោជន៍។

៤. ការប្រើប្រាស់ដី

ការប្រើដីទ្រាប់បាត ប្រើដីធម្មជាតិ ឬ ដីលាមកសត្វក្នុងកម្រិត ៣០ គីឡូក្រាម ក្នុងមួយរងរាល់ជាមួយកំបោរកសិកម្មចំនួន ៨ខែ ក្នុងមួយរង និងដី 15-15-15 ចំនួន ២.៥ ខែក្នុងមួយរង។ លាយច្របល់ដី និងកំបោរចូលទៅក្នុងដីឱ្យបានស្មើសាច់ល្អ ហើយ ស្រោចទឹកឱ្យជោគដ៏ល្អម រួចក្រាលកៅស៊ូគ្របលើរង ហើយរក្សាទុករយៈពេលពី ៧-១០ ថ្ងៃមុនពេលដាំ ។

- ប្រើដីប្រភេទ 15-15-15 ក្នុងកម្រិត ១០ក្រាម/គុម្ព ដាក់បង្គប់បាត រណ្តៅមុន ពេលដាំ
- ដីបំប៉នលើកទី១ ដាក់នៅពេលពូនគល់ ឬ ពេលដាក់ទ្រើង ប្រើដី 15-15-15 ក្នុង កម្រិត ១០ក្រាម/គុម្ព ដាក់បង្គប់ក្នុងដីចំនួន២កន្លែង នៅក្បែរគុម្ពចំងាយ ១០សម ពីគល់របស់វា។
- ដីបំប៉នលើកទី២ ដាក់នៅក្រោយពេលប្រមូលផលលើកទី១ ប្រើដីអ៊ុយរ៉េ ក្នុងកម្រិត ១០ក្រាម/គុម្ព ដាក់បង្គប់ក្នុងដីចំនួន២កន្លែង នៅក្បែរគុម្ពចំងាយ ១០ សម ពីគល់របស់វា។
- ដីបំប៉នលើកទី៣ ប្រើដី FDP-IDE ក្នុងកម្រិត១គ្រាប់/គុម្ព ដាក់បង្គប់នៅក្នុងដី ក្បែរគុម្ពដំណាំ នៅក្រោយពេលដាក់លើកទី២ បានរយៈពេល ១០-១២ថ្ងៃ ។

៣. វិធីសាស្ត្ររៀបចំដី និង ដាក់ដីទ្រាប់បាត

សណ្តែកទ្រើង តម្រូវអោយយើងធ្វើការដាំដុះនៅលើរង ហើយដាំវាជាជួរៗ ដូច្នេះ មុនពេលលើករងយើងត្រូវធ្វើការភ្ជួររាស់ដី អោយបានយ៉ាងតិចចំនួន២ដង ហើយ ការភ្ជួរដី លើកទី២ គឺក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ១សប្តាហ៍ ក្រោយពេលភ្ជួរ លើកទី១រួច។ លើករង ដែលមានទទឹងប្រវែង ៨០សម និងបណ្តោយទៅតាមស្ថានភាពដី ចំពោះ ចន្លោះ ពីរដងមួយទៅដងមួយ គឺមានប្រវែង៥០សម ដើម្បីងាយស្រួល រៀបចំទ្រើង និង ប្រមូល ផល។ នៅរដូវប្រាំង យើងមិនចាំបាច់លើករងអោយខ្ពស់ពេកទេ កំពស់រងដែលសមស្រប សម្រាប់រដូវប្រាំងគឺចាប់ពី ១០-១៥ ស,ម តែនៅរដូវវស្សាវិញ យើងចាំបាច់ត្រូវលើករង ឱ្យខ្ពស់ ដើម្បីការពារទឹកលិចរង ក្នុងករណីដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និង ធ្វើអោយរង សណ្តែកឆាប់ស្រក់ទឹកល្អ ដូច្នេះ យើងត្រូវលើករងឱ្យបានកំពស់ ៣០ស.ម ។

