



ပန်းဂေါ်ဖီမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း

ALIVE-FNS စီမံကိန်း

ချင်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)

ကုန်းမြင့်တောင်သူများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်



ဒေသတွင်းရှိ မျိုးကွဲ/မျိုးစုံ တောင်သူ ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဒေသထွက် မျိုးစေ့များကို ထိန်းသိမ်းရန် ပန်းဂေါ်ဖီမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း။



၁။ ပန်းဂေါ်ဖီသည် ပျိုးပင်ရွှေ့စိုက်ရသောသီးနှံဖြစ်သည်။ ပျိုးဘောင် ၃ပေ အကျယ်၊ အမြင့် ၆ လက်မ ကို ပြုလုပ်၍ နောက်ချေး (သို့) မြေဆွေးကို ၂-၃ kg/m² နှုန်းဖြင့်ထည့်ပါ။ မျိုးစေ့ကို ၅ လက်မခြား အတန်းလိုက်အစေ့ချပြီး၊ ပျိုးပင် ၃-၄လက်မအရွယ်တွင် ကြိုလိုသော ပျိုးပင်များကို ဖယ်ထုတ်ပေးရမည်။ ပျိုးပင်များသည် ပျိုးဘောင်တွင် ရက်၃၀ တစ်လသား အထိ ထားရန် နှင့် ရွက်မှန် (၃-၄) ရွက်ခန့် ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးချိန်တွင် စိုက်ခင်းထဲသို့ ရွှေ့စိုက်ပေးရမည်။



၂။ ကောင်းမွန်စွာ ပြုပြင်ထားသော စိုက်ခင်းတွင် ပျိုးပင်များကို ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပါ။ စိုက်ခင်း၏မြေဆီဩဇာ ပေါ်မူတည်၍ ၁၀၀ စတုရန်း မီတာတွင် သစ်ဆွေးမြေဩဇာ ၇-၁၀ အိတ်ထည့်ရပါမည်။ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရာတွင် သာမန်စိုက်ခင်းများထက် ပျိုးပင်အကွာအဝေး ပိုကျယ်ရန် လိုအပ်သည်။ ပင်ခြား/တန်းခြားအကွာအဝေးမှာ တစ်ပင်နှင့် တစ်ပင်(၁)ပေခြား၊ တစ်တန်းနှင့်တစ်တန်း (၁.၅) ပေခြား စိုက်ပျိုးခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပျိုးပင်ရွှေ့စိုက်ပြီး (၄၅)ရက်အကြာတွင် သစ်ဆွေးမြေဩဇာ (သို့) နောက်ချေးကို တစ်ပင်လျှင် လက်နှစ်ဆုပ်စာ (၀.၅ kg) နှုန်း ကျွေးရပါမည်။



၃။ အပင်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်း: ကြိုလိုသော အပင်၊ ရောဂါကျ ရောက်သောအပင်၊ အပင် ပုံသဏ္ဍာန် မမှန်သောအပင် (သို့) ကြီးထွားမှု နည်းပါးသောအပင်များကို အပင်ကြီးထွားချိန် နှင့် ပန်းပွင့်ချိန်တို့တွင် ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ မကောင်းသောအပင်များကို ဖယ်ရှား ခြင်းသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော မျိုးစေ့ထုတ် လုပ်ရာတွင် အရေးကြီး သော အဆင့်ဖြစ်သည်။
၄။ ပန်းပွင့်ချိန်တွင် အပင်နှစ်ဘက်တွင်ပွင့်သော ပန်းခိုင်ငယ်များသည် မျိုးစေ့အရည်အသွေးညံ့ ဖျင်းတတ်သောကြောင့် ဖြတ်/ညှပ်ပေးရမည်။ ကျန်မာသန်စွမ်းသော အလယ်ဗဟိုပန်းခိုင်ကိုသာ ချန်ထားပေးရမည်။



၅။ အသီးတောင့်များ ခြောက်သွေ့သွားသောအခါ ရိတ်သိမ်းပါ။ သီးတောင့်များ အညိုရောင် သန်းချိန်တွင် အတွင်းမှအစေ့များသည် အညိုရောင်ဖျော့အဆင့်သို့ ပြောင်းသွားပြီး သီးတောင့်မာလာသည်။ သီးတောင့်များ အပင်ပေါ်တွင် ရင့်မှည့်ခြောက်သွေ့သည် အထိထား ရန်နှင့် ပန်းခိုင်ထိပ်ကို ဖြတ်/ညှပ်ပေးခြင်းဖြင့် အာဟာရပြည့်စုံ သော အစေ့အဆန်ပါ သီးတောင့်များ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
၆။ ပန်းခိုင်များကို ရိတ်သိမ်း၍ အရိပ်ထဲတွင် နှစ်ပတ်ထား ပါ။ အသီးတောင့်များကို ချွေလှေ့၍ အမှိုက်/အစအနများ ကို ဖယ်ရှားပါ။ အစေ့များသည် ကြွပ်ရွတ်သောကြောင့် အစေ့အဆန်များ မကြေရန် သေချာကိုင်တွယ်ရပါမည်။ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့သော အစေ့များကို အေးမြခြောက်သွေ့သော အမှောင်ခန်းတွင် လုံခြုံစွာ ဖုံးအုပ်၍ သိုလှောင်ထားရမည်။

ပန်းဂေါ်ဖီမျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူး နှင့် ယေဘုယျ အခြေအနေ

ချင်းပြည်နယ်တွင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့် ၁၅၀၀မီတာ (၄၅၀၀ ပေ)ခန့်တွင် မျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီ အောက်တိုဘာလတွင် စိုက်ပျိုးပြီး နောက်မိုးရာသီ မရောက်မှီ ဧပြီလ- မေလတွင် မျိုးစေ့ထုတ်ယူရပါမည်။ ပန်းပွင့်များ ကြီးထွားရန်အတွက် ဆောင်းရာသီတွင် အပူချိန် ၅-၁၀°C ရရှိရန် လိုအပ်သည်။ ပန်းဂေါ်ဖီတပင်လျှင် မျိုးစေ့ ၁၅-၂၀ ဂရမ် ထုတ်လုပ်ရရှိနိုင်သည်။ မျိုးစေ့များသည် စနစ်တကျသိုလှောင်ပါက (၄)နှစ်အထိ အပင်ပေါက်မှုကောင်းပါသည်။