

ວິທີທີ 1 - ການເຮັດໜານຜັກ 2 ຊັ້ນ

- ວິທີທີ 2 - ການເຮັດໝານທົ່ວໄປ (ໝານຊີ້ນດຽວ)**

-

ផ្លូវដាច់ខាត៖

- **ທ່ານ ຊຸທິ ຊາວຈາ**, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ,
<icdienglish9@gmail.com>
- **ທ່ານ ນາງ ສົດສຸດາ ອຸດົມສຸກ**, ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ,
<Osodsuda@yahoo.com>
- **ວັນທີເຜີຍແຜ່: ມີນາ 2026**

- ຈົກ, ຊ້ວນ, ພ້າ, ຄູ, ບົວ, ບັ້ງສິດ, ຄາດ, ຜ້າຢາງ, ຜ້າກັນແສງ

ຄັງທີ 1 (ລະດູຝົນ ແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ)

ຄັງທີ 2 (ລະດູແລ້ງ ແຕ່ເດືອນພະຈິກ ຫາ ເດືອນເມສາ)

- ## ຜົນປະໂຫຍດຂອງວິທີການເຫຼົ່ານີ້

- ## ທີມງານອາລິເຊຍ

- ຜູ້ປະສານງານລະດັບພາກພື້ນ: **ລູຊີ ເຣໂນ**
<reynaud@gret.org>
- ກອງເລຂາອາລິເຊຍປະຈຳລາວ: **ສຸຕິມາ ບຸດວິເສດ**
<soutima2506@gmail.com>

 www.ali-sea.org

សង្ខេបសង្ខេបណ្តាម្នាក់៖



ປະສານງານໂດຍ:



សະឡាប់សະឡាញ់តាំងតែដោយ:



 Co-funded by
the European Union



ເອກະສານປຶ້ງສ້າງໜ້າໜີ້ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກອົງການຜ່ານຜັງ ເພື່ອການພັດທະນາ (AFD), ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ກອງທຶນຜ່ານຜັງເພື່ອສົ່ງແຜ່ລ້ອມໂລກ (FFEM). ພັດທະນະທິສະແດງອອກໃນເອກະສານສະບັບນີ້ຈະບໍ່ຖືກວ່າເປັນການສະແດງທິດສະນະທີ່ເປັນທາງການຂອງ ອົງການ AFD, EU ແລະ FFEM.



ແຜ່ນພັບດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ
ເຕັກນິກການປູກຜັກແບບຍືນຍົງ



ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ສປປ
ລາວ

ລະບົບນິເວດກະສິກຳ:

ເຂດ	ກິດຈະກຳຫຼັກ	ສະພາບອາກາດ	ປະລິມານນ້ຳຝົນ	ອຸນຫະພູມ
ທົ່ງພຽງ	ເຂົ້າ, ສາລີ, ພັນອິນຊີ ແລະ ລ້ງສັດ	ເຂດຮ້ອນຊຸ່ມຕາມລະດູການ (ລະດູຝົນ: ເດືອນມິຖຸນາ- ຕຸລາ)	~1500–2000 ມມ/ປີ	ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ ສູງສຸດ: 23°C - ຕໍ່ສຸດ: 14°C

ການປູກພືດແບບປະສົມປະສານ

ການປູກພືດແບບປະສົມປະສານ ແມ່ນວິທີການປູກແບບຍືນຍົງ ທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງຂຶ້ນ, ດິນມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ແລະຊ່ວຍຄວບຄຸມສັດຕູພືດຕາມທຳມະຊາດ. ໂດຍເປັນການປະສົມປະສານທີ່ສາມາດນຳໄປປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນຕ່ຳ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການກະສິກຳທີ່ເກີນທານ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ການຫວ່ານແກ່ນທົ່ວໄປ (ລະດູຝົນ)



ໝາຍເຖິງການຫວ່ານແນວພັນລົງໜານຜັກ ຫຼື ສວນ ໂດຍກົງ. ສຳລັບແນວພັນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ຄວນໃຊ້ກະປ໋ອງທີ່ມີຝາປິດ ແລະ ເຈາະຮູນ້ອຍໆໃສ່ຝາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການກະຈາຍແນວພັນເປັນໄປຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ຫຼັງຈາກຫວ່ານແລ້ວ, ໃຫ້ຖືກດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ດິນບາງໆ, ແລ້ວຄ່ອຍໆທົດນ້ຳໃສ່ ຈົນກວ່າດິນຈະຊຸ່ມ.

ການໃສ່ຝຸ່ນ (ລະດູແລ້ງ)



ການໃສ່ຝຸ່ນຄວນອີງຕາມຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ ແລະ ປະຕິບັດຕາມອັດຕາທີ່ແນະນຳສຳລັບການໃຊ້ໃນສວນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຝຸ່ນອິນຊີຈະໃສ່ສອງຄັ້ງຕໍ່ໜຶ່ງຮອບການປູກຜັກ ໃນອັດຕາ 1 ກິໂລກຣາມຕໍ່ 2 ຕາແມັດ. ການໃສ່ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນຊ່ວງເມື່ອຕົ້ນພືດອອກສອງໃບທຳອິດ ແລະ ການໃສ່ຄັ້ງທີສອງແມ່ນຊ່ວງເມື່ອຕົ້ນພືດເຕີບໂຕເຕັມທີ່.

ການປົກຄຸມໜານ



ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວ, ໃຫ້ຄຸມດິນດ້ວຍເຟືອງ, ຫຍ້າແຫ້ງ ຫຼື ໃບພືດສົດຕະກຸນຖ້ວ ປົກຄຸມໜານໃຫ້ໜາພໍປະມານ. ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເກີດຂອງວັດສະພືດ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດິນຟັງຕິດໃສ່ໃບຜັກ ແລະ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນອີກດ້ວຍ. ການຄຸມດິນແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ດູແລຮັກສາພືດຜົນ.

ການປູກພືດໝູນວຽນ



ໝາຍເຖິງການປູກພືດຫຼາຍຊະນິດແຕກຕ່າງກັນປູກສະລັບກັນໃນແຕ່ລະລະດູການ. ການປູກພືດຊະນິດດຽວຊ້າໆ ຈະພາໃຫ້ເກີດສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດຊ້າເຮື້ອ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນພືດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກທຳລາຍຈາກແມງໄມ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການປູກຜັກດ້ວຍການບົງເບ້ຍ



ແມ່ນການຫວ່ານແນວພັນໃສ່ບ່ອນທີ່ໜຶ່ງ ແລ້ວຍ້າຍຕົ້ນກຳໄປປູກໃນອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ ຫຼື ເຄື່ອງມືນ້ອຍໆຈຶ່ງເອົາຕົ້ນກຳພ້ອມກັບດິນທີ່ຕິດຂຶ້ນມາກັບຮາກ. ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນພືດຕັ້ງຕົ້ນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໃບຢ່າງແຂງແຮງ.

ການໃຫ້ນ້ຳ



ຄວນປັບການໃຫ້ນ້ຳ ຕາມຄວາມເໝາະສົມແຕ່ລະສະພາບອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະໝໍ່າສະເໝີ — ບໍ່ຄວນໃຫ້ດິນປຽກ ຫຼື ແຫ້ງຈົນເກີນໄປ. ກວດເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນວັນລະສອງຄັ້ງ. ໃນລະດູແລ້ງ, ທົດນ້ຳໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ. ໃນລະດູຝົນ, ການຮັດນ້ຳວັນລະຄັ້ງກໍພຽງພໍແລ້ວ (ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະກັບສວນຄົວເຮືອນເທົ່ານັ້ນ).

ການປູກເປັນຊຸມ



ຊຸດເປັນຊຸມໆ ແລ້ວປູກຕົ້ນກຳໃສ່ 1 ຫາ 3 ຕົ້ນ ໃນແຕ່ລະຊຸມ. ດ້ວຍການຫວ່ານແກ່ນ ຫລື ຍ້າຍໄປບົງ ເຊິ່ງເໝາະກັບການປູກໃນພື້ນທີ່ ທີ່ກວ້າງ, ມີນ້ຳໜ້ອຍ ຫລື ອາດຊຸດຊຸມຕາມຫວ່າງກາງຂອງໜານຜັກກໍໄດ້ ເຊິ່ງເປັນການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງ

ການເກັບກ່ຽວ



ການເກັບກ່ຽວແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ຊະນິດ ແລະ ຕາມອາຍຸຂອງມັນ. ຊ່ວງເວລາທີ່ຄວນເກັບກ່ຽວແມ່ນຕອນເຊົ້າໆ ຫຼື ຕອນແລງໆ ທີ່ອຸນຫະພູມຂ້ອນຂ້າງເຢັນ ແລະ ຄວນທົດນ້ຳກ່ອນເກັບກ່ຽວ. ເພື່ອຮັກສາຜັກໃຫ້ສົດໄດ້ດົນຂຶ້ນ ບໍ່ຄວນຕັດຮາກອອກ ແລະ ໃຊ້ໃບຕອງຫ່ວາງໄວ້ໃນລວງຕັ້ງຂອງຜັກ, ບໍ່ຄວນເອົາຜັກໃສ່ແໜ້ນເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຜັກເກີດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເນົາເສຍໄດ້ງ່າຍ.