

វិធីសាស្ត្របុរាណសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសត្វល្អិតនាពេលបច្ចុប្បន្ន

កសិករ ប្រើប្រាស់សត្វអង្ក្រង (Oecophylla smaragdina, Hymenoptera) សម្រាប់ការពារដំណាំស្វាយ និងក្រូច ពីសត្វល្អិតបំផ្លាញ នៅតំបន់អាស៊ីអស់រយៈពេលជាង 2000 ឆ្នាំ មកហើយ ដូច្នេះ វាគឺជាការអនុវត្តការការពារដំណាំបែបធម្មជាតិដ៏យូរមកហើយក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ប៉ុន្តែមានកសិករខ្នាតតូចមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះនៅតាមដងទន្លេមេគង្គបន្តរក្សាសត្វអង្ក្រងដែលជាសត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំផ្លាញនៃសត្វល្អិតជាពិសេសលើដំណាំស្វាយចន្ទី។

តាមធម្មតា កសិករតែងឃើញមានសត្វអង្ក្រងរស់នៅក្នុងចម្ការស្វាយចន្ទីសរីរាង្គ ប៉ុន្តែពួកគាត់ភាគច្រើនមិនបានដឹងនៅឡើយពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើន ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីរក្សា និងបង្កើនចំនួនរបស់វាដើម្បីប្រើវាការពារដំណាំពីសត្វល្អិតបំផ្លាញ។

ឯកសារណែនាំបច្ចេកទេសរៀបចំដោយ៖ Rada Kong, Mathilde Sester, Sievmeng Ly, Phal Sophat, Jean-Philippe Deguine



បទពិសោធន៍របស់កសិករ



អ្នកស្រី **សេង សុវណ្ណារិម** ជាកសិករដាំស្វាយចន្ទី និងបានចូលរួមជាមួយគម្រោង ASSET នៅខេត្តព្រះវិហារ

តើអ្នកស្រីបានរៀនអំពីសត្វអង្ក្រងដោយរបៀបណា?

ពេលប្រមូលផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទី សត្វអង្ក្រងបានខាំខ្ញុំ និងខិតខំ ដូច្នេះខិតខំចង់ចាញ់ថ្នាំសម្លាប់វា។ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជំទាស់ ហើយបង្ហាញគាត់ថា តាមពិតសត្វអង្ក្រងមានអត្ថប្រយោជន៍ដោយសារវាសំលាប់ និងស៊ីដង្កូវ (កង្កែបមូលស្លឹកកង្កែបស្លឹក កង្កែបចោះផ្លែ)។ ខ្ញុំប្រាប់គាត់ឱ្យសង្កេតមើលដើម និងមែកដែលមានសត្វអង្ក្រង មានផ្លែច្រើន ហើយគាត់ជឿខ្ញុំថា ការរក្សាសត្វអង្ក្រងជួយកំចាត់សត្វល្អិត។

តើអ្នកស្រីបានពង្រីកចំនួនអង្ក្រងទៅគ្រប់ដើមទាំងអស់ក្នុងចម្ការឬទេ?

ខ្ញុំបានរៀនពីរបៀបធ្វើសំបុកអង្ក្រងពីគម្រោង ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ខ្ញុំមិនបានធ្វើសំបុកទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំលុបឱ្យអ្នកចាក់អង្ក្រង (ចាក់សំបុកយកពង និងកូនទៅលាក់នៅផ្សារ) ក្នុងចម្ការរបស់ខ្ញុំ។ សូម្បីៗខ្ញុំក៏ចង់យកធ្វើជាចំណីព្រឹក្នុងស្រះក៏ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាវា។ ដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញសត្វអង្ក្រងមានស្ទើរគ្រប់ដើមក្នុងចម្ការរបស់ខ្ញុំ។

តើគុណភាពនៃគ្រាប់ចន្ទីយ៉ាងម៉េចដែរ? តើវាមានគុណភាពល្អជាងឬទេ?

គ្រាប់ចន្ទីធំស្មើ ស្អាត និងរលោងល្អជាង។ ទោះទុកយូរក៏សាច់វានៅស និងពេញល្អ។ ខ្ញុំសាកកាប់១០គ្រាប់មើល។ ខ្ញុំឃើញថា ៩គ្រាប់ មានសាច់ពេញ។ ខ្ញុំមិនដឹងពីរសជាតិយ៉ាងម៉េចទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាសជាតិវាក៏ល្អជាងដែរ។



ជាដុះមាននិរន្តរភាព បរិភោគដើម្បីសុខភាព

អនុវត្តកសិអេកូឡូស៊ី

f in X @ASSETProjectSEA



សហការនិង



ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុ



Co-funded by the European Union



This document has been produced with the financial assistance of the French Development Agency (AFD), the European Union (EU) and the French Facility for Global Environment (FFEM). The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the AFD, EU and FFEM.

ឯកសារណែនាំបច្ចេកទេស៖
**សត្វអង្ក្រង៖ ការអនុវត្តអេកូឡូស៊ី
បែបធម្មជាតិដើម្បីការពារសត្វ
បំផ្លាញលើចម្ការស្វាយចន្ទី**




តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពង្រីក និងរក្សាចំនួនសត្វអង្ក្រង?

ដើម្បីពង្រីក និងធានាអោយមានវត្តមានសត្វអង្ក្រងជាអចិន្ត្រៃយ៍ ក្នុងចម្ការស្វាយចន្ទី កសិករគួរអនុវត្តន៍តាមការណែនាំដែលមាន ៣ជំហានសំខាន់ៗ។ កសិករគួរអនុវត្តនៅខែវិច្ឆិកា ព្រោះជាពេល ចេញត្រួយ ផ្កា និងក្តិប ទាក់ទាញសត្វល្អិតបំផ្លាញ ដែលជាចំណី សត្វអង្ក្រង។ ពេលសំបូរចំណី សត្វអង្ក្រងចាប់ផ្តើមបង្កើតសំបុក ថ្មីៗ ពង្រីកចំនួនឆាប់រហ័ស និងរស់នៅក្នុងចម្ការចន្ទីតែម្តង។

ជំហានទី 1៖ កំណត់វត្តមាន និងគ្រួសារអង្ក្រង

- កំណត់ដើមដែលមានសត្វអង្ក្រងដោយយកឈើគោះដើម ឬមែកស្រាលៗ។
- កំណត់គ្រួសារសត្វអង្ក្រងដោយយកអង្ក្រងពីដើម១ ទៅជួបនៅ ដើម១ទៀត។ បើវាខាត្នា វានៅក្នុងគ្រួសារផ្សេងគ្នា ហើយបើ មិនខាត្នាទេ មានន័យថាវានៅក្នុងគ្រួសារតែមួយ។
- គូសផែនទីចំការ សម្គាល់ដើមណាមានសត្វអង្ក្រង និងស្ថិតក្នុង គ្រួសារមួយណា ហើយតំណត់ដើមសម្រាប់ពង្រីក។




ជំហានទី 2៖ ពង្រីកចំនួនអង្ក្រង

- ពិនិត្យដើមចន្ទីអំណោយផលសម្រាប់ការផ្ទេរសំបុក៖ ត្រូវ មានមែកច្រើន ស្លឹកខ្ចីៗ និងគ្មានស្រមោចខ្មៅដែលកសិករ ហៅថាត្រោក។ ត្រូវកម្ចាត់ត្រោកដោយកាត់សំបុកយកចោល និងសំលាប់ចំនួនដែលនៅសល់ ព្រោះអង្ក្រងខ្លាចត្រោក។




- ការផ្ទេរសំបុកសត្វអង្ក្រងទៅចម្ការដែលគ្មានសត្វអង្ក្រង៖
 - ជ្រើសយកសំបុកធំ និងថ្មីពីចំការផ្សេង ឬព្រៃក្បែរនោះ។ កាត់សំបុកដាក់ក្នុងកាបូនរួចចងមាត់ ហើយយកទៅចង ព្យួរនៅដើមដែលចង់ផ្ទេរ ដោយស្រាយចំហរមាត់កាបូន។ រក្សាទុកកាបូនរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃ អោយអង្ក្រងរាវចេញ បង្កើតសំបុក និងជញ្ជូនពង និងកូនមិនទាន់ញាស់ទៅ រស់នៅសំបុកថ្មី។



- ការពង្រីកចំនួនសត្វអង្ក្រងក្នុងចម្ការ៖
 - ប្រើខ្សែចងក្តាប់មែកដើមដែលមានសត្វអង្ក្រងទៅដើម ដែលគ្មាន ដើម្បីសម្រួលអោយសត្វអង្ក្រងផ្លាស់ទី និង អាចបង្កើតសំបុករស់នៅនៅដើមថ្មីៗ។
 - ដើម្បីពង្រីកចំនួនអោយបានច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លី កសិករ អាចផ្ទេរសំបុកសត្វអង្ក្រងដូចបានពិពណ៌នាខាងលើ។

ស្មែន ឬចូចលើតំណភ្ជាប់ ដើម្បីមើលវីដេអូបច្ចេកទេស



ជំហានទី 3៖ ការពារ និងថែរក្សាចំនួនសត្វអង្ក្រង

- ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំ សំលាប់ស្មៅ ព្រោះវាអាចសម្លាប់ ឬប្រដេញសត្វអង្ក្រង បាន។
- រក្សា ឬដាំដើមឈើដូចជា ស្វាយ ក្រូចឆ្មារ ឬ ដើមឈើហូបផ្លែផ្សេងទៀតនៅជុំវិញ ឬក្នុងចំការ។ ដើមឈើទាំងនេះផ្តល់ជម្រក និងប្រភពអាហារសម្រាប់ សត្វអង្ក្រង ជាពិសេសនៅរដូវវស្សា ពេលដើមចន្ទីជ្រុះ ស្លឹក និងមិនសំបូរចំណី។
- តាមដានដើមចន្ទីដែលមានគ្រួសារសត្វអង្ក្រងផ្សេងគ្នា។ បើមែកវាប៉ះគ្នា កសិករត្រូវកាត់មែកចោលដើម្បីការពារកុំ អោយវាខាំគ្នា។
- ជៀសវាងការចាក់សំបុកសត្វអង្ក្រងប្រមូលយកពង និង កូន ព្រោះធ្វើអោយថយចំនួនសត្វអង្ក្រង។

តើសត្វអង្ក្រងអាចការពារដើមឈើហូបផ្លែ យ៉ាងដូចម្តេច?

ក្នុងកំឡុងពេល ចេញត្រួយ ចេញផ្កា និងបង្កើតក្តិប គឺជា ពេលដែលដើមចន្ទីងាយទទួលការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត។ វាក៏ ជាពេលដែលត្រួយ ផ្កា និងក្តិបទាំងនេះបញ្ចេញទឹកដម ហើយសត្វអង្ក្រងប្រមូលយកទឹកដមទាំងនេះទៅទុកក្នុង សំបុកធ្វើចំណី។ សត្វអង្ក្រងធ្វើចលនាទៅត្រប់ទីកន្លែងដើម្បី ប្រមូលយកទឹកដមនេះ ហើយវាក៏ត្បាតការពារដើមចន្ទីពី សត្វល្អិតបំផ្លាញដោយវាសំលាប់ធ្វើជាចំណី ឬប្រដេញ។ ជាធម្មតាសត្វអង្ក្រងធ្វើចលនារាល់ 30-60 វិនាទី ដូច្នេះវា មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារសត្វល្អិតបំផ្លាញលើដើម ចន្ទី។

